

Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я

ФАРМАКОТЕРАПИЯ

№ **42** ТОМ 17
2021



*Ambrosia
artemisiifolia*

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
И ИММУНОЛОГИЯ №1

Фармакотерапия
спонтанной крапивницы
в особых
группах пациентов

6

Клиническая
эффективность
дупилумаба
в терапии тяжелого
атопического дерматита

12



umedp.ru

Свежие выпуски
и архив журнала

Дупиксент® — биологический препарат, ингибирующий функции одновременно двух ключевых цитокинов ИЛ-4 и ИЛ-13, играющих роль в патогенезе астмы^{1,2}

T2-АСТМА³
Дупиксент®
(дупиломаб)

ПУТЬ К ДОЛГОСРОЧНОМУ КОНТРОЛЮ АСТМЫ⁴

В качестве дополнительной поддерживающей терапии для пациентов старше 12 лет со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астмой¹

СНИЖЕНИЕ ЧАСТОТЫ
ТЯЖЕЛЫХ ОБОСТРЕНИЙ

до **81%**

у пациентов с исходным уровнем ЭОЗ > 300 кл/мкл, получавших дупиломаб в дозе 300 мг к2н в сочетании с базисной терапией*²

ПОЛНАЯ ОТМЕНА
ПГКС

у **48%**

пациентов, получавших дупиломаб в дозе 300 мг к2н в сочетании с базисной терапией*⁵

УЛУЧШЕНИЕ ОФВ₁

до **480** мл

к 52 неделе по сравнению с исходным уровнем у пациентов, с ЭОЗ > 300 кл/мкл, получавших дупиломаб в дозе 300 мг к2н в сочетании с базисной терапией*⁴

Реклама

ЭОЗ — эозинофилы; кл/мкл — клеток в микролитре; к2н — каждые 2 недели; ПГКС — пероральные глюкокортикостероиды; ОФВ₁ — объем форсированного выдоха за первую секунду
* Базисная терапия включала в себя применение средних или высоких доз ингаляционных глюкокортикостероидов в сочетании с бета-2 агонистами и ПГКС у пациентов с гормонозависимой астмой

Список литературы:

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Дупиксент® РУ № ЛП-005440 от 04.04.2019 г. Лекарственная форма: раствор для подкожного введения. Фармакологические свойства: дупиломаб — рекомбинантное человеческое моноклональное антитело (подтип IgG4) к α-субъединице рецептора интерлейкина-4. Фармакотерапевтическая группа: ингибиторы интерлейкина. Код АТХ: D11AH05. Показания к применению: атопический дерматит среднетяжелого и тяжелого течения у пациентов от 6 лет и старше при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению. Препарат Дупиксент® может применяться в монотерапии или одновременно с топическими лекарственными препаратами: в качестве дополнительной поддерживающей терапии бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения у пациентов 12 лет и старше с эозинофильным фенотипом или у пациентов с гормонозависимой бронхиальной астмой, получающих пероральные глюкокортикостероиды. В качестве дополнительной поддерживающей терапии взрослых пациентов с плохо контролируемым тяжелым хроническим полипозным риносинуситом. Противопоказания: повышенная чувствительность к дупиломабу или любому из вспомогательных веществ препарата; детский возраст до 6 лет у пациентов с атопическим дерматитом среднетяжелого и тяжелого течения, детский возраст до 12 лет для пациентов с бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения в связи с неустановленными эффективностью и безопасностью применения. С осторожностью: при беременности (только если ожидаемая польза превышает потенциальный риск для плода). Способ применения и дозы: препарат Дупиксент® вводится подкожно. Атопический дерматит: рекомендуемая доза препарата Дупиксент® у взрослых пациентов состоит из начальной дозы 600 мг (2 инъекции по 300 мг) и введения далее 300 мг каждые две недели; в зависимости от индивидуального терапевтического ответа доза может быть увеличена до 300 мг ежедневно. Рекомендуемая доза препарата Дупиксент® у пациентов с атопическим дерматитом в возрасте 6-17 лет: для пациентов с массой тела от 15 до 30 кг начальная доза — 600 мг (2 инъекции по 300 мг), далее по 300 мг каждые 4 недели, для пациентов с массой тела от 30 до 60 кг начальная доза — 400 мг (2 инъекции по 200 мг), далее по 200 мг каждые 2 недели; для пациентов с массой тела 60 кг и более начальная доза — 600 мг (2 инъекции по 300 мг), далее по 300 мг каждые 2 недели. Бронхиальная астма: рекомендуемая доза препарата Дупиксент® у взрослых пациентов и детей (12 лет и старше): начальная доза — 400 мг (2 инъекции по 200 мг), далее по 200 мг каждые 2 недели или начальная доза — 600 мг (2 инъекции по 300 мг), далее по 300 мг каждые 2 недели. Для пациентов с глюкокортикостероидозависимой бронхиальной астмой или с сопутствующим среднетяжелым или тяжелым атопическим дерматитом, при котором показано применение препарата Дупиксент®, лечение начинают с дозы 600 мг (2 инъекции по 300 мг), далее по 300 мг каждые 2 недели. Хронический полипозный риносинусит: начальная рекомендуемая доза для взрослых пациентов — 300 мг, далее 300 мг каждые 2 недели. В случае пропуска дозы пациент должен получить инъекцию как можно скорее и затем продолжить лечение в соответствии с назначенным ему режимом введения препарата. Побочное действие: наиболее частыми нежелательными реакциями, которые наблюдались в клинических исследованиях у пациентов с атопическим дерматитом, были конъюнктивит, бактериальный конъюнктивит, аллергический конъюнктивит, реакции в месте инъекции, герпес ротовой полости, эозинофилия, простой герпес, блефарит, зуд в глазах, синдром сухого глаза; наиболее частыми нежелательными реакциями, которые наблюдались в клинических исследованиях у пациентов с бронхиальной астмой, были эритема, отек и зуд в месте инъекции. Профиль нежелательных реакций у подростков с бронхиальной астмой и/или с атопическим дерматитом 12 лет и старше был схож с таковым у взрослых пациентов. Частыми нежелательными реакциями, которые наблюдались в клинических исследованиях у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом, были конъюнктивит, реакции и отек в месте инъекции.

SANOFI GENZYME

Для работников здравоохранения.
Представительство АО «Санофи-авентис груп» (Франция)
125009, Москва, ул. Тверская, д. 22. Тел.: (495) 721-14-00, факс: (495) 721-14-11, www.sanofi.ru
MAT-RU-2001023-3.0-06/2021

Дупиксент®
(дупиломаб)

Эффективная фармакотерапия. 2021.
Том 17. № 42.
Аллергология и иммунология

ISSN 2307-3586

© Агентство медицинской информации «Медфорум»
127422, Москва, ул. Тимирязевская,
д. 1, стр. 3, тел. (495) 234-07-34
www.medforum-agency.ru

Руководитель проекта
«Аллергология и иммунология»
А. ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА
(a.perevezentseva@medforum-agency.ru)

Effective Pharmacotherapy. 2021.
Volume 17. Issue 42.
Allergology and Immunology

ISSN 2307-3586

© Medforum Medical Information Agency
1/3 Timiryazevskaya Street Moscow, 127422 Russian Federation
Phone: 7-495-2340734
www.medforum-agency.ru

Advertising Manager
‘Allergology and Immunology’
A. PEREVEZENTSEVA
(a.perevezentseva@medforum-agency.ru)

Редакционная коллегия

Ю.Г. АЛЯЕВ (*главный редактор*),
член-корр. РАН, профессор, д.м.н. (Москва)
И.С. БАЗИН (*ответственный секретарь*), *д.м.н. (Москва)*
Ф.Т. АГЕЕВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
И.Б. БЕЛЯЕВА, *профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)*
М.Р. БОГОМИЛЬСКИЙ, *член-корр. РАН, профессор, д.м.н. (Москва)*
Д.С. БОРДИН, *профессор, д.м.н. (Москва)*
Н.М. ВОРОБЬЕВА, *д.м.н. (Москва)*
О.В. ВОРОБЬЕВА, *профессор, д.м.н. (Москва)*
М.А. ГОМБЕРГ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
В.А. ГОРБУНОВА, *профессор, д.м.н. (Москва)*
А.В. ГОРЕЛОВ, *член-корр. РАН, профессор, д.м.н. (Москва)*
Л.В. ДЕМИДОВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
А.А. ЗАЙЦЕВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
В.В. ЗАХАРОВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
И.Н. ЗАХАРОВА, *профессор, д.м.н. (Москва)*
Д.Е. КАРАТЕЕВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
А.В. КАРАУЛОВ, *академик РАН, профессор, д.м.н. (Москва)*
Ю.А. КАРПОВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
Е.П. КАРПОВА, *профессор, д.м.н. (Москва)*
О.В. КНЯЗЕВ, *д.м.н. (Москва)*
В.В. КОВАЛЬЧУК, *профессор, д.м.н. (Москва)*
В.С. КОЗЛОВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
И.М. КОРСУНСКАЯ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
Г.Г. КРИВОБОРОДОВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
И.В. КУЗНЕЦОВА, *профессор, д.м.н. (Москва)*
О.М. ЛЕСНЯК, *профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)*
И.А. ЛОСКУТОВ, *д.м.н. (Москва)*
Л.В. ЛУСС, *академик РАЕН, профессор, д.м.н. (Москва)*
Д.Ю. МАЙЧУК, *д.м.н. (Москва)*
А.Б. МАЛАХОВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
С.Ю. МАРЦЕВИЧ, *член-корр. РАЕН, профессор, д.м.н. (Москва)*
О.Н. МИНУШКИН, *профессор, д.м.н. (Москва)*
А.М. МКРТУМЯН, *профессор, д.м.н. (Москва)*
Д.В. НЕБИЕРИДЗЕ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
Н.М. НЕНАШЕВА, *профессор, д.м.н. (Москва)*
А.Ю. ОВЧИННИКОВ, *профессор, д.м.н. (Москва)*
О.Ш. ОЙНОТКИНОВА, *профессор, д.м.н. (Москва)*
Н.А. ПЕТУНИНА, *член-корр. РАН, профессор, д.м.н. (Москва)*

Editorial Board

Yury G. ALYAEV (*Editor-in-Chief*),
Prof., MD, PhD (Moscow)
Igor S. BAZIN (*Executive Editor*), *MD, PhD (Moscow)*
Fail T. AGEYEV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Irina B. BELYAYEVA, *Prof., MD, PhD (St. Petersburg)*
Mikhail R. BOGOMILSKY, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Dmitry S. BORDIN, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Natalya M. VOROBYOVA, *MD, PhD (Moscow)*
Olga V. VOROBYOVA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Mikhail A. GOMBERG, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Vera A. GORBUNOVA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Aleksandr V. GORELOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Lev V. DEMIDOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Andrey A. ZAYTSEV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Vladimir V. ZAKHAROV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Irina N. ZAKHAROVA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Dmitry Ye. KARATEYEV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Aleksandr V. KARAULOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Yury A. KARPOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Yelena P. KARPOVA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Oleg V. KNAYZEV, *MD, PhD (Moscow)*
Vitaly V. KOVALCHUK, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Vladimir S. KOZLOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Irina M. KORSUNSKAYA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Grigory G. KRIVOBORODOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Irina V. KUZNETSOVA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Olga M. LESNYAK, *Prof. MD, PhD (St. Petersburg)*
Igor A. LOSKUTOV, *MD, PhD (Moscow)*
Lyudmila V. LUSS, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Dmitry Yu. MAYCHUK, *MD, PhD (Moscow)*
Aleksandr B. MALAKHOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Sergey Yu. MARTSEVICH, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Oleg N. MINUSHKIN, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Ashot M. MKRTUMYAN, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
David V. NEBIERIDZE, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Natalya M. NENASHEVA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Andrey Yu. OVCHINNIKOV, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Olga Sh. OYNOTKINOVA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*
Nina A. PETUNINA, *Prof., MD, PhD (Moscow)*

Редакционная коллегия

В.И. ПОПАДЮК, профессор, д.м.н. (Москва)
В.Н. ПРИЛЕПСКАЯ, профессор, д.м.н. (Москва)
О.А. ПУСТОТИНА, профессор, д.м.н. (Москва)
В.И. РУДЕНКО, профессор, д.м.н. (Москва)
С.В. РЯЗАНЦЕВ, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)
С.В. СААКЯН, профессор, д.м.н. (Москва)
Е.А. САБЕЛЬНИКОВА, профессор, д.м.н. (Москва)
М.С. САВЕНКОВА, профессор, д.м.н. (Москва)
А.И. СИНОПАЛЬНИКОВ, профессор, д.м.н. (Москва)
О.М. СМIRНОВА, профессор, д.м.н. (Москва)
Е.С. СНАРСКАЯ, профессор, д.м.н. (Москва)
Н.А. ТАТАРОВА, профессор, д.м.н. (Санкт-Петербург)
В.Ф. УЧАЙКИН, академик РАН, профессор, д.м.н. (Москва)
Е.И. ШМЕЛЕВ, профессор, д.м.н. (Москва)

Редакционный совет

Акушерство и гинекология

В.О. АНДРЕЕВА, И.А. АПОЛИХИНА, В.Е. БАЛАН, К.Р. БАХТИЯРОВ,
В.Ф. БЕЖЕНАРЬ, О.А. ГРОМОВА, Ю.Э. ДОБРОХОТОВА,
С.А. ЛЕВАКОВ, Л.Е. МУРАШКО, Т.А. ОБОСКАЛОВА,
Т.В. ОВСЯННИКОВА, С.И. РОГОВСКАЯ, О.А. САПРЫКИНА,
В.Н. СЕРОВ, И.С. СИДОРОВА, Е.В. УВАРОВА

Аллергология и иммунология

Н.Г. АСТАФЬЕВА, О.С. БОДНЯ, Л.А. ГОРЯЧКИНА,
А.В. ЕМЕЛЬЯНОВ, Н.И. ИЛЫНА, О.М. КУРБАЧЕВА,
В.А. РЕВЯКИНА, О.И. СИДОРОВИЧ, Е.П. ТЕРЕХОВА,
Д.С. ФОМИНА

Гастроэнтерология

М.Д. АРДАТСКАЯ, И.Г. БАКУЛИН, С.В. БЕЛЬМЕР, С. БОР,
И.А. БОРИСОВ, Е.И. БРЕХОВ, Е.В. ВИННИЦКАЯ,
Е.А. КОРНИЕНКО, Л.Н. КОСТЮЧЕНКО, Ю.А. КУЧЕРЯВЫЙ,
М. ЛЕЯ, М.А. ЛИВЗАН, И.Д. ЛОРАНСКАЯ, В.А. МАКСИМОВ,
Ф. Ди МАРИО

Дерматовенерология и дерматокосметология

А.Г. ГАДЖИГОРОЕВА, В.И. КИСИНА, С.В. КЛЮЧАРЕВА,
Н.Г. КОЧЕРГИН, Е.В. ЛИПОВА, С.А. МАСЮКОВА,
А.В. МОЛОЧКОВ, В.А. МОЛОЧКОВ, Ю.Н. ПЕРЛАМУТРОВ,
И.Б. ТРОФИМОВА, А.А. ХАЛДИН, А.Н. ХЛЕБНИКОВА,
А.А. ХРЯНИН, Н.И. ЧЕРНОВА

Кардиология и ангиология

Г.А. БАРЫШНИКОВА, М.Г. БУБНОВА, Ж.Д. КОБАЛАВА,
М.Ю. СИТНИКОВА, М.Д. СМIRНОВА, О.Н. ТКАЧЕВА

Неврология и психиатрия

Неврология

Е.С. АКАРАЧКОВА, А.Н. БАРИНОВ, Н.В. ВАХНИНА,
В.Л. ГОЛУБЕВ, О.С. ДАВЫДОВ, А.Б. ДАНИЛОВ, Г.Е. ИВАНОВА,
Н.Е. ИВАНОВА, А.И. ИСАЙКИН, П.Р. КАМЧАТНОВ,
С.В. КОТОВ, О.В. КОТОВА, М.Л. КУКУШКИН, О.С. ЛЕВИН,
А.Б. ЛОКШИНА, А.В. НАУМОВ, А.Б. ОБУХОВА,
М.Г. ПОЛУЭКТОВ, И.С. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, А.А. СКОРОМЕЦ,
И.А. СТРОКОВ, Г.Р. ТАБЕЕВА, Н.А. ШАМАЛОВ,
В.А. ШИРОКОВ, В.И. ШМЫРЕВ, Н.Н. ЯХНО

Психиатрия

А.Е. БОБРОВ, Н.Н. ИВАНЕЦ, С.В. ИВАНОВ, Г.И. КОПЕЙКО,
В.Н. КРАСНОВ, С.Н. МОСОЛОВ, Н.Г. НЕЗНАНОВ,
Ю.В. ПОПОВ, А.Б. СМУЛЕВИЧ

Editorial Board

Valentin I. POPADYUK, Prof., MD, PhD (Moscow)
Vera N. PRILEPSKAYA, Prof., MD, PhD (Moscow)
Olga A. PUSTOTINA, Prof., MD, PhD (Moscow)
Vadim I. RUDENKO, Prof., MD, PhD (Moscow)
Sergey V. RYAZANTSEV, Prof., MD, PhD (St. Petersburg)
Svetlana V. SAAKYAN, Prof., MD, PhD (Moscow)
Yelena A. SABELNIKOVA, Prof., MD, PhD (Moscow)
Marina S. SAVENKOVA, Prof., MD, PhD (Moscow)
Aleksandr I. SINOPALNIKOV, Prof., MD, PhD (Moscow)
Olga M. SMIRNOVA, Prof., MD, PhD (Moscow)
Yelena S. SNARSKAYA, Prof., MD, PhD (Moscow)
Nina A. TATAROVA, Prof., MD, PhD (St. Petersburg)
Vasily F. UCHAYKIN, Prof., MD, PhD (Moscow)
Yevgeny I. SHMELYOV, Prof., MD, PhD (Moscow)

Editorial Council

Obstetrics and Gynecology

V.O. ANDREYEVA, I.A. APOLIKHINA, V.Ye. BALAN, K.R. BAKHTIYAROV,
V.F. BEZHENAR, O.A. GROMOVA, Yu.E. DOBROKHOTOVA,
S.A. LEVAKOV, L.Ye. MURASHKO, T.A. OBOSKALOVA,
T.V. OVSYANNIKOVA, S.I. ROGOVSKAYA, O.A. SAPRYKINA,
V.N. SEROV, I.S. SIDOROVA, Ye.V. UVAROVA

Allergology and Immunology

N.G. ASTAFYEVA, O.S. BODNYA, L.A. GORYACHKINA,
A.V. YEMELYANOV, N.I. ILYINA, O.M. KURBACHYOVA,
V.A. REVYAKINA, O.I. SIDOROVICH, Ye.P. TEREKHOVA,
D.S. FOMINA

Gastroenterology

M.D. ARDATSKAYA, I.G. BAKULIN, S.V. BELMER, S. BOR,
I.A. BORISOV, Ye.I. BREKHOV, Ye.V. VINNITSKAYA,
Ye.A. KORNIYENKO, L.N. KOSTYUCHENKO, Yu.A. KUCHERYAVY,
M. LEYA, M.A. LIVZAN, I.D. LORANSKAYA, V.A. MAKSIMOV,
F. Di MARIO

Dermatovenereology and Dermatocosmetology

A.G. GADZHIGOROYEVA, V.I. KISINA, S.V. KLYUCHAREVA,
N.G. KOCHERGIN, Ye.V. LIPOVA, S.A. MASYUKOVA,
A.V. MOLOCHKOV, V.A. MOLOCHKOV, Yu.N. PERLAMUTROV,
I.B. TROFIMOVA, A.A. KHALDIN, A.N. KHLEBNIKOVA,
A.A. KHRYANIN, N.I. CHERNOVA

Cardiology and Angiology

G.A. BARYSHNIKOVA, M.G. BUBNOVA, Zh.D. KOBALAVA,
M.Yu. SITNIKOVA, M.D. SMIRNOVA, O.N. TKACHEVA

Neurology and Psychiatry

Neurology

Ye.S. AKARACHKOVA, A.N. BARINOV, N.V. VAKHNINA,
V.L. GOLUBEV, O.S. DAVYDOV, A.B. DANILOV, G.Ye. IVANOVA,
N.Ye. IVANOVA, A.I. ISAYKIN, P.R. KAMCHATNOV,
S.V. KOTOV, O.V. KOTOVA, M.L. KUKUSHKIN, O.S. LEVIN,
A.B. LOKSHINA, A.V. NAUMOV, A.B. OBUKHOVA,
M.G. POLUEKTOV, I.S. PREOBRAZHENSAYA, A.A. SKOROMETS,
I.A. STROKOV, G.R. TABEYeva, N.A. SHAMALOV,
V.A. SHIROKOV, V.I. SHMYREV, N.N. YAKHNO

Psychiatry

A.Ye. BOBROV, N.N. IVANETS, S.V. IVANOV, G.I. KOPEYKO,
V.N. KRASNOV, S.N. MOSOLOV, N.G. NEZANOV,
Yu.V. POPOV, A.B. SMULEVICH

Онкология, гематология и радиология

Б.Я. АЛЕКСЕЕВ, Е.В. АРТАМОНОВА, Н.С. БЕСОВА,
М.Б. БЫЧКОВ, А.М. ГАРИН, С.Л. ГУТОРОВ, И.Л. ДАВЫДКИН,
А.А. МЕЩЕРЯКОВ, И.Г. РУСАКОВ, В.Ф. СЕМИГЛАЗОВ,
А.Г. ТУРКИНА

Офтальмология

О.А. КИСЕЛЕВА, М.А. ФРОЛОВ

Педиатрия

И.В. БЕРЕЖНАЯ, Н.А. ГЕППЕ, Ю.А. ДМИТРИЕВА,
О.В. ЗАЙЦЕВА, В.А. РЕВЯКИНА, Д.А. ТУЛУПОВ

Пульмонология и оториноларингология

А.А. ВИЗЕЛЬ, Н.П. КНЯЖЕСКАЯ, С.В. КОЗЛОВ,
Е.В. ПЕРЕДКОВА, Е.Л. САВЛЕВИЧ,
О.И. СИМОНОВА

Ревматология, травматология и ортопедия

Л.И. АЛЕКСЕЕВА, Л.П. АНАНЬЕВА, Р.М. БАЛАБАНОВА,
Б.С. БЕЛОВ, В.И. ВАСИЛЬЕВ, Л.Н. ДЕНИСОВ, И.С. ДЫДЫКИНА,
Н.В. ЗАГОРОДНИЙ, И.А. ЗБОРОВСКАЯ, Е.Г. ЗОТКИН,
А.Е. КАРАТЕЕВ, Н.В. ТОРОПЦОВА, Н.В. ЧИЧАСОВА,
Н.В. ЯРЫГИН

Урология и нефрология

А.Б. БАТЬКО, А.З. ВИНАРОВ, С.И. ГАМИДОВ, О.Н. КОТЕНКОВ,
К.Л. ЛОКШИН, А.Г. МАРТОВ, А.Ю. ПОПОВА, И.А. ТЮЗИКОВ,
Е.М. ШИЛОВ

Эндокринология

М.Б. АНЦИФЕРОВ, И.А. БОНДАРЬ, Г.Р. ГАЛСТЯН, С.В. ДОГАДИН,
В.С. ЗАДИОНЧЕНКО, Е.Л. НАСОНОВ, А.А. НЕЛАЕВА,
В.А. ПЕТЕРКОВА, В.А. ТЕРЕЩЕНКО, Ю.Ш. ХАЛИМОВ,
М.В. ШЕСТАКОВА

Эпидемиология и инфекции

Н.Н. БРИКО, Г.Х. ВИКУЛОВ, Л.Н. МАЗАНКОВА, Е.В. МЕЛЕХИНА,
А.А. НОВОКШОНОВ, Т.В. РУЖЕНЦОВА, Н.В. СКРИПЧЕНКО,
А.В. СУНДУКОВ, Д.В. УСЕНКО, Ф.С. ХАРЛАМОВА

Редакция

Шеф-редактор Т. ЧЕМЕРИС

Выпускающие редакторы Н. РАМОС, Н. ФРОЛОВА

Журналисты А. ГОРЧАКОВА, С. ЕВСТАФЬЕВА

Корректор Е. САМОЙЛОВА

Дизайнеры Т. АФОНЬКИН, Н. НИКАШИН

Фотосъемка Е. ДЕЙКУН

Oncology, Hematology and Radiology

B.Ya. ALEXEYEV, Ye.V. ARTAMONOVA, N.S. BESOVA,
M.B. BYCHKOV, A.M. GARIN, S.L. GUTOROV, I.L. DAVYDKIN,
A.A. MESHCHERYAKOV, I.G. RUSAKOV, V.F. SEMIGLAZOV,
A.G. TURKINA

Ophthalmology

O.A. KISELYOVA, M.A. FROLOV

Pediatrics

I.V. BEREZHNYAYA, N.A. GEPPE, Yu.A. DMITRIYEVA,
O.V. ZAYTSEVA, V.A. REVYAKINA, D.A. TULUPOV

Pulmonology and Otorhinolaryngology

A.A. VIZEL, N.P. KNYAZHESKAYA, S.V. KOZLOV,
Ye.V. PEREDKOVA, Ye.L. SAVLEVICH,
O.I. SIMONOVA

Rheumatology, Traumatology and Orthopaedics

L.I. ALEKSEYEVA, L.P. ANANYEVA, R.M. BALABANOVA,
B.S. BELOV, V.I. VASILYEV, L.N. DENISOV, I.S. DYDYKINA,
N.V. ZAGORODNY, I.A. ZBOROVSKAYA, Ye.G. ZOTKIN,
A.Ye. KARATEYEV, N.V. TOROPTSOVA, N.V. CHICHASOVA,
N.V. YARYGIN

Urology and Nephrology

A.B. BATKO, A.Z. VINAROV, S.I. GAMIDOV, O.N. KOTENKOV,
K.L. LOKSHIN, A.G. MARTOV, A.Yu. POPOVA, I.A. TYUZIKOV,
Ye.M. SHILOV

Endocrinology

M.B. ANTSIFEROV, I.A. BONDAR, G.R. GALSTYAN, S.V. DOGADIN,
V.S. ZADIONCHENKO, Ye.L. NASONOV, A.A. NELAYEVA,
V.A. PETERKOVA, V.A. TERESHCHENKO, Yu.Sh. KHALIMOV,
M.V. SHESTAKOVA

Epidemiology and Infections

N.N. BRIKO, G.Kh. VIKULOV, L.N. MAZANKOVA, Ye.V. MELEKHINA,
A.A. NOVOKSHONOV, T.V. RUZHENTSOVA, N.V. SKRIPCHENKO,
A.V. SUNDUKOV, D.V. USENKO, F.S. KHARLAMOVA

Editorial Staff

Editor-in-Chief T. CHEMERIS

Commissioning Editors N. RAMOS, N. FROLOVA

Journalists A. GORCHAKOVA, S. YEVSTAFYEVA

Corrector Ye. SAMOYLOVA

Art Designers T. AFONKIN, N. NIKASHIN

Photography Ye. DEYKUN

Тираж 7500 экз. Выходит 3 раза в год. Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ № ФС77-23066 от 27.09.2005.

Бесплатная подписка на электронную версию журнала
на сайте www.umedp.ru.

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных
материалов. Любое воспроизведение материалов и их фрагментов
возможно только с письменного разрешения редакции журнала.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Авторы, присылающие статьи для публикации, должны быть
ознакомлены с инструкциями для авторов и публичным авторским
договором. Информация размещена на сайте www.umedp.ru.

Журнал «Эффективная фармакотерапия» включен в перечень
рецензируемых научных изданий ВАК и индексируется в системе РИНЦ,

Print run of 7500 copies. Published 3 times a year.
Registration certificate of mass media ПИ № ФС77-23066 of 27.09.2005.

Free subscription to the journal electronic version
on the website www.umedp.ru.

The Editorials is not responsible for the content of advertising materials.

Any reproduction of materials and their fragments is possible only
with the written permission of the journal. The Editorials' opinion
may not coincide with the opinion of the authors.

Authors submitted articles for the publication should be acquainted
with the instructions for authors and the public copyright agreement.

The information is available on the website www.umedp.ru.

'Effective Pharmacotherapy' Journal is included in the list of reviewed
scientific publications of VAK and is indexed in the RSCI system.

Содержание

Лекции для врачей

О.В. СЕБЕКИНА
Современные подходы к лечению хронической крапивницы 6

Клиническая практика

Е.В. ПЕРЕДКОВА, О.В. СЕБЕКИНА, Н.М. НЕНАШЕВА,
М.Ю. ПЕРЕДЕЛЬСКАЯ
Новые возможности терапии тяжелого атопического
дерматита у взрослых 12

Contents

Clinical Lectures

O.V. SEBEKINA
Modern Approaches to the Treatment of Chronic Urticaria

Clinical Practice

E.V. PEREDKOVA, O.V. SEBEKINA, N.M. NENASHEVA,
M.Yu. PEREDEL'SKAYA
New Treatment Options for Severe Atopic
Dermatitis in Adults



Прямой эфир на медицинском портале для врачей uMEDp.ru



Онлайн-школы, онлайн-семинары, вебинары, конгрессы, конференции

- Все основные направления медицины
- Актуальные темы в выступлениях лучших экспертов
- Дискуссии, клинические разборы, лекции
- Качество подключений к трансляции
- Неограниченное число участников
- Обратная связь со спикером, ответы в прямом эфире
- Электронная рассылка с записью видео после эфира

Сетка вещания <https://umedp.ru/online-events/>



Также на портале читайте научные обзоры, результаты исследований, клинические разборы, интервью с ведущими специалистами, международные и российские новости.

Регистрируйтесь на портале, чтобы быть в курсе



**МЕДИЦИНСКИЙ
ПОРТАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
UMEDP.RU**

- <https://vk.com/vk.medforum>
- <https://www.facebook.com/medforum.agency>
- https://www.instagram.com/umedp_/
- <https://www.youtube.com/umedportal>



Современные подходы к лечению хронической крапивницы

О.В. Себекина, д.м.н.

Адрес для переписки: Оксана Владимировна Себекина, sebekin1@mail.ru

Для цитирования: Себекина О.В. Современные подходы к лечению хронической крапивницы // Эффективная фармакотерапия. 2021. Т. 17. № 42. С. 6–11.

DOI 10.33978/2307-3586-2021-17-42-6-11

В статье представлены современные данные о хронической спонтанной крапивнице в свете обновленных рекомендаций международных научных обществ аллерголов-иммунологов. Препараты первой линии терапии – неседативные H_1 -антигистаминные препараты (АГП) II поколения – характеризуются экви-эффективностью и различиями фармакокинетики и безопасности. Биластин – современный представитель H_1 -АГП II поколения с быстрым началом и длительным действием, отличается отсутствием значимого печеночного метаболизма. Надежный профиль безопасности при применении даже в дозах, четырехкратно превышающих терапевтические, дает основание рекомендовать биластин в качестве препарата выбора коморбидным пациентам и лицам пожилого возраста, а также детям.

Ключевые слова: хроническая спонтанная крапивница, обновленные рекомендации по крапивнице, H_1 -антигистаминные препараты, биластин

Введение

Крапивница – это распространенное заболевание, клинически проявляющееся уртикарной сыпью, ангионевротическим отеком или их сочетанием, центральная роль в патогенезе которого принадлежит тучным клеткам. Различают острую и хроническую крапивницу. Хроническая крапивница подразделяется на спонтанную и индуцируемую. Хроническая спонтанная крапивница (ХСК) и хроническая индуцируемая крапивница (ХИНК) оказывают существенное влияние на качество жизни, негативно отражаются на рабочем процессе, обучении и повседневной жизни [1]. Согласно результатам В.Ф. О’Donnell и соавт., показатели состояния здоровья по оценкам пациентов с ХСК и пациентов с ишемической болезнью сердца оказались сопоставимыми [2]. А по данным I. Baiardini и соавт., состояние здоровья и субъективная удовлетворенность жизнью у пациентов с ХСК ниже, чем у пациентов с аллергическими заболеваниями органов дыхания [3].

Эпидемиология, классификация хронической крапивницы

Распространенность ХСК варьирует в пределах 0,5–5% [4]. Новые данные показывают, что распространенность ХСК достаточно высока во всех возрастных группах. В педиатрической популяции она не меньше, чем в популяции взрослых, и продолжает расти [5].

Причина ХСК может быть известна (например, аутоиммунная крапивница типа I с образованием аутоантител IgE к аутоантигенам и аутоиммунная ХСК типа IIb с аутоантителами, активирующими тучные клетки), но чаще причины неизвестны.

ХИНК подразделяется на симптоматический дермографизм, холодовую крапивницу, замедленную крапивницу от давления, солнечную крапивницу, тепловую крапивницу, вибрационный ангиоотек, холинергическую крапивницу, контактную крапивницу и аквагенную крапивницу.



У пациента могут сосуществовать два или более разных подтипа крапивницы. Спектр клинических проявлений различных типов и подтипов крапивницы очень широк.

Патофизиологические аспекты крапивницы


Ключевую роль в формировании крапивницы играют тучные клетки. Гистамин и другие медиаторы, такие как фактор активации тромбоцитов и цитокины, высвобождаемые активированными тучными клетками кожи, вызывают активацию сенсорных нервов, расширение сосудов и экстравазацию плазмы, а также привлечение клеток. Сигналы, активирующие тучные клетки при крапивнице, неоднородны и разнообразны.

В настоящее время выделено два эндотипа ХСК: аутоиммунный тип I и аутоиммунный тип IIb. Несколько недавних отчетов помогли лучше охарактеризовать эти эндотипы: аутоаллергический тип I управляется IgE к аутоаллергенам, а в патогенезе аутоиммунного типа IIb главенствующую роль играют аутоантитела IgG против IgE и его высокоаффинного рецептора (FcεRI), экспрессирующего на поверхности тучных клеток. При обоих эндотипах реализуется механизм активации тучных клеток, приводящий к их дегрануляции (рисунок) [6].

Дифференциальный диагноз

Крапивница может возникать как одно из клинических проявлений других заболеваний – уртикарного васкулита; анафилаксии, индуцируемой физической нагрузкой; аутовоспалительных синдромов; мастоцитоза; брадикинин-опосредованного ангионевротического отека, включая наследственный ангионевротический отек. Поэтому дифференциальная диагностика ХСК и ХИНК предусматривает проведение тщательного обследования для исключения заболеваний, клиническим симптомом которых могут быть волдыри, ангионевротический отек или их сочетание. При ведении пациента с ХСК необходимо выявить и исключить возможные триггеры. Безусловно, надо проводить обучение пациента и выработать индивидуальный план ведения. Кроме того, проводя диагностику, клиницист должен убедиться в том, что эпизоды высыпаний не сопровождаются приемом НПВП (например, аспирина, ибупрофена и др.) и отсутствует временная связь с приемом тех или иных продуктов питания для исключения пищевой аллергии.

Диагностическое обследование пациентов с ХСК должно быть направлено на подтверждение диагноза; поиск первопричин; определение условий, которые изменяют активность болезни; учет сопутствующих заболеваний; оценку предикторов болезни; прогнозирование ответа на назначенное лечение.



Эндотипы хронической спонтанной крапивницы (адаптировано из [6])

Международные и отечественные руководства по ведению пациентов с ХСК

Ведение пациентов с аллергическими заболеваниями регламентируется утвержденными стандартами и рекомендациями научных международных и отечественных обществ, которые постоянно обновляются и совершенствуются по мере поступления новых данных из рандомизированных контролируемых и наблюдательных клинических исследований, систематических обзоров и мета-анализов. Европейская академия аллергии и клинической иммунологии (EAACI) в содружестве с Глобальной европейской сетью по аллергии и астме (GA²LEN), Европейским дерматологическим форумом (EDF) и Всемирной организацией по аллергии (WAO) обновила рекомендации по лечению хронической крапивницы, опубликованные в 2018 г. в журнале *Allergy* [7]. Это обновленное руководство, в составлении которого участвовали и российские ученые, опубликовано в журнале *Allergy* и находится в открытом доступе [8]. В обновленном документе представлены определение, классификация, диагностические и терапевтические подходы к различным подтипам крапивницы, разработанные на основании объединенных научных данных и консенсусных заключений экспертов в области иммунологии, аллергологии и дерматологии. Основные положения рекомендаций EAACI/GA²LEN/EDF/WAO по ступенчатому алгоритму фармакотерапии (ФТ) ХСК с указанием силы консенсусного согласия группы экспертов представлены в табл. 1 и 2. В настоящее время по показанию ХСК зарегистрированы только неседативные H₁-АГП II поколения и омализумаб, причем неседативные H₁-АГП II поколения рекомендуется применять на всех ступенях терапии. Положения Российского руководства по ведению больных



Таблица 1. Ступенчатый алгоритм фармакотерапии ХСК (2021): рекомендуемая ФТ

Ступень	Линия ФТ	Препараты	Сила консенсусного согласия по рекомендации
Первая	Первая	Неседативные H ₁ -АГП II поколения*	Высокий уровень консенсусного согласия (100%)
Вторая	Вторая	Неседативные H ₁ -АГП II поколения в эскалационных дозах, четырехкратно превышающих рекомендованные терапевтические дозы**	Консенсусное согласие (≥ 90%)
Третья	Третья	Омализумаб в качестве дополнительной терапии***	Консенсусное согласие (≥ 90%)
Четвертая	Четвертая	Циклоспорин А в качестве дополнительной терапии****	–

(адаптировано из [8])

Примечание. Сила консенсусного согласия определяется тремя уровнями: высокий уровень консенсусного согласия (с рекомендацией согласились 100% участников); консенсусное согласие (с рекомендацией согласились ≥ 90% участников); согласие большинства (с рекомендацией согласились 51–69%).

* Неседативные H₁-АГП II поколения рекомендуется применять ежедневно на постоянной основе, а не в режиме по потребности (уровень консенсусного согласия ≥ 90%). Во многих странах терфенадин и астмизол больше не коммерциализируются, так как проявляют кардиотоксичность при совместном применении с ингибиторами изоформы цитохрома P450 (СУР) 3А4 (кетоназол, эритромицин) [9]. Современные исследования подтверждают надежный профиль безопасности биластина, цетиризина, дезлоратадина, эбастина, фексофенадина, левоцетиризина, лоратадина и рупатадина [8, 10–14].

** Предпочтение отдается препаратам, доказавшим надежный профиль безопасности при применении в дозах, превышающих рекомендованные терапевтические дозы. Преимущество применения более высоких, чем стандартные, доз неседативных H₁-АГП II поколения у пациентов с крапивницей было продемонстрировано в нескольких исследованиях, результаты которых подтверждают безопасную эскалацию доз, четырехкратно превышающих рекомендованные терапевтические дозы биластина, цетиризина, дезлоратадина, эбастина, фексофенадина, левоцетиризина и рупатадина [8, 10–14].

*** Омализумаб – пока единственный биологический препарат, одобренный по показанию ХСК. Омализумаб характеризуется высокой эффективностью и безопасностью. При недостаточном контроле симптомов ХСК при применении омализумаба в рекомендуемой однократной дозе 300 мг дозировка может быть увеличена до 600 мг, а интервалы между инъекциями могут быть сокращены с четырех до двух недель [15].

**** Несмотря на то что эффективность циклоспорина А в комбинации с неседативными H₁-АГП II поколения была доказана в рандомизированных плацебоконтролируемых и наблюдательных исследованиях ХСК, этот препарат нельзя рекомендовать в качестве стандартного лечения из-за отсутствия регистрации по показанию ХСК и высокой частоты побочных эффектов. Циклоспорин А в дозе 5 мг/кг веса может быть применен как дополнительная терапия только у пациентов с рефрактерной формой ХСК, не поддающейся лечению вышеперечисленными методами. Решение о назначении циклоспорина А пациентам с ХСК должно приниматься на основании консенсусного одобрения экспертной комиссией лечебного учреждения при информированном согласии пациента (высокий уровень консенсусного согласия) [8].

Таблица 2. Ступенчатый алгоритм фармакотерапии ХСК (2021): нерекомендуемая терапия

Фармацевтические группы препаратов, которые не рекомендуется применять для лечения ХСК	Сила консенсусного согласия по рекомендации
H ₁ -АГП I поколения*, в том числе в сочетании с H ₂ -АГП	Высокий уровень консенсусного согласия
Системные КС в качестве дополнительной терапии**	Высокий уровень консенсусного согласия

(адаптировано из [8])

* H₁-АГП I поколения не должны применяться при ХСК вследствие неблагоприятного соотношения «польза – риск».

** Системные КС не рекомендуются в качестве дополнительной терапии, но применяются в качестве препаратов скорой помощи при тяжелом обострении ХСК коротким курсом (высокий уровень консенсусного согласия) [8].

крапивницей, разработанные Российским обществом дерматовенерологов и косметологов при поддержке Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов в 2018 г., практически полностью соответствуют европейским рекомендациям 2018 г. [9].

Положения обновленных рекомендаций Американской академии аллергии, астмы и иммунологии (ААААИ) по фармакотерапии в своей основе соответствуют европейским рекомендациям ЕААСI/GA²LEN/EDF/WAO (2021):

1. Препараты первой линии – H₁-АГП II поколения.
2. В случае недостаточного контроля симптомов ХСК добавляется омализумаб.

3. Системные кортикостероиды (КС) рекомендуется применять только для краткосрочного ФТ-вмешательства и не использовать длительно.

4. При рефрактерной форме ХСК, не поддающейся лечению вышеперечисленными методами, в качестве дополнительной терапии возможно применение циклоспорина А [16].

В то же время рекомендации ААААИ имеют некоторые отступления:

1. В случае недостаточного контроля ХСК посредством H₁-АГП II поколения ААААИ, как и европейские научные общества, не рекомендуют одновременное применение разных H₁-АГП II поколения, признавая отсутствие доказательств высокого уровня, подтверждающих терапевтическую эффек-



тивность такой комбинации. В то же время ААААI допускает достаточно распространенную в США практику назначения фексофенадина (180 мг) по утрам в сочетании с цетиризином (10 мг) на ночь, основываясь на доказанной эффективности такой комбинации.

2. ААААI также не рекомендует H₂-АГП и антилейкотриеновые лекарственные препараты (ЛП) в качестве дополнительной терапии к H₁-АГП II поколения, так как доказательства, подтверждающие терапевтическую эффективность этих агентов, низкого качества. Но поскольку H₂-АГП и антилейкотриеновые ЛП характеризуются низкой частотой нежелательных реакций и, как правило, доступны по цене, ААААI считает целесообразным рекомендовать комбинацию H₁-АГП и H₂-АГП, а также монтелукаст (слабая сила рекомендации) в качестве дополнительной терапии.

Фармакотерапия в особых группах пациентов

Беременные и лактирующие женщины

При хронической крапивнице во время беременности и грудного вскармливания лечение антигистаминными препаратами может быть сокращено, поскольку симптоматика хронической крапивницы во время беременности, как правило, смягчается. Однако в ряде случаев течение ХСК может ухудшиться. Беременным женщинам следует сообщить, что ни один препарат не может считаться абсолютно безопасным. Антигистаминные препараты следует использовать только в случае крайней необходимости. Если во время беременности необходимы антигистаминные препараты, следует использовать самую низкую дозу хлорфенамина, цетиризина или лоратадина. Кормящим матерям рекомендуется применять цетиризин или лоратадин в самых низких дозах, а применения хлорфенамина следует избегать.

Дети

Эффективное и безопасное применение биластина у детей доказано в рандомизированном контролируемом исследовании. Профиль безопасности и переносимости биластина в дозе 10 мг у детей в возрасте от 2 до 12 лет с ХСК и аллергическим риноконъюнктивитом был аналогичен профилю безопасности плацебо. В другом многоцентровом двойном слепом плацебоконтролируемом исследовании фазы III биластин применяли в форме раствора диспергируемых таблеток в дозе 10 мг/сут в популяции из 509 детей в течение 12 недель. Профиль безопасности оценивали по нежелательным явлениям, возникшим во время лечения (НЯВЛ), лабораторным показателям, параметрам ЭКГ (кардиотоксичность) и по результатам опросника PSQ, разработанного для оценки сонливости

и седативного эффекта в педиатрической практике. Клинически значимых различий между группой биластина и группой плацебо не наблюдали. Доли детей без НЯВЛ в сравниваемых группах были идентичны: 31,5 и 32,5% [17]. Эффективность и безопасность при применении в педиатрической популяции также продемонстрировали цетиризин, дезлоратадин, фексофенадин, левоцетиризин, лоратадин и рупатадин [8]. При выборе неседативного H₁-АГП II поколения лечащий врач должен учитывать возраст ребенка, так как зарегистрированные по показанию ХСК препараты этой фармацевтической группы различаются по возрастным ограничениям и лекарственным формам. Для применения у детей младшего возраста наиболее удобны жидкие лекарственные формы (раствор, сироп) и быстро-растворимые диспергируемые таблетки.

Пожилые пациенты

Распространенность аллергических заболеваний у лиц старше 65 лет не уступает этому показателю в других возрастных группах и, вероятно, будет расти вследствие увеличения продолжительности жизни и количества людей с аллергией. Пациенты пожилого возраста характеризуются полиморбидностью и полипрагмазией, поэтому к выбору того или иного лекарственного средства для этой возрастной группы необходимо подходить особенно тщательно, чтобы не допустить нежелательных межлекарственных взаимодействий и серьезных лекарственных реакций, в том числе антихолинергических эффектов и седации, которые характерны для H₁-АГП I поколения и некоторых представителей H₁-АГП II поколения. Эффективность и безопасность биластина в дозах, превышающих рекомендованные терапевтические, делают это антигистаминное средство препаратом выбора у пожилых. Биластин не вызывает седативных эффектов, не влияет на когнитивные функции и не усиливает действия алкоголя и бензодиазепинов при совместном применении. Этот ЛП не оказывает кардиотоксического действия. Биластин может применяться у пациентов с нарушениями функции печени и почек без редукции дозы, что очень важно в реальной клинической практике, так как однократный прием в стабильной дозе обеспечивает высокую приверженность терапии. Благоприятный профиль безопасности биластина во многом определяется отсутствием значительного печеночного метаболизма и взаимодействия с системой цитохрома P450 [18].

Инструменты оценки эффективности проводимой терапии

Чтобы успешно управлять тактикой ведения пациента с ХСК, лечащему врачу необходимо



оценивать активность заболевания, влияние ХСК на качество жизни пациента и определять эффективность терапии. Количественная оценка пациентом (PROM – patient reported outcome measure) относится к наиболее простым и доступным инструментам, которые основаны на специально разработанных для ХСК унифицированных валидированных шкалах. Эти инструменты позволяют пациенту самостоятельно оценивать тяжесть течения (активность) ХСК, влияние на качество жизни и контроль заболевания в количественном выражении – баллах. Такая оценка удобна и для пациента, и для врача, так как позволяет объективно оценивать состояние пациента и его индивидуальный ответ на проводимую терапию в каждый момент времени.

Оценка активности ХСК и влияния заболевания на качество жизни

Активность ХСК определяют по шкалам UAS7 (англ. Urticaria Activity Score) и AAS7 (англ. Angioedema Activity Score): пациент оценивает выраженность основных симптомов (количество высыпаний и интенсивность зуда) в баллах по шкале UAS7 каждые 24 часа в течение семи последовательных дней. Шкала AAS7 используется у пациентов с ангиоотечкой. При сочетании волдырей и ангиоотечка рекомендуется использовать обе шкалы. Для определения влияния болезни на качество жизни используют шкалы CU-Q2oL и AE-QoL (в зависимости от превалирования в клинической картине уртикарной сыпи и ангиоотечка соответственно).

Оценка контроля ХСК

Контроль заболевания у пациентов с ХСК определяют по баллу теста контроля над симптомами крапивницы – UCT (англ. Urticaria Control Test). У пациентов с ангиоотечкой используют АЕСТ (англ. Angioedema Control Test). При сочетании волдырей и ангиоотечка применяют обе шкалы. UCT и АЕСТ состоят из четырех вопросов, на каждый из которых предлагается пять вариантов ответов, которые различаются по степени выраженности и оцениваются в баллах от 0 до 4 (от максимальной степени выраженности до полного отсутствия или наоборот – от полного отсутствия до высшей степени выраженности). Вопросы касаются контроля симптомов болезни, влияния ХСК на качество жизни, эффективности лечения, общего контроля заболевания. Для UCT четко определены пределы балльных значений, позволяющих отличать «хорошо контролируемую ХСК» от «плохо контролируемой ХСК». Максимальный балл 16 отражает полный контроль ХСК. Балл 12 является пограничным уровнем в оценке контроля заболевания.

Основные рекомендации по ведению пациентов с ХСК

Ведение пациентов с ХСК складывается из трех основных этапов, составляющих замкнутую последовательность в виде спирали *оценка* → *действие* → *коррекция*:

- *Оценка пациента врачом*: постановка диагноза, определение коморбидности, тяжести течения ХСК, предпочтения пациента, нежелательные побочные эффекты ФТ.
- *Действия врача*: изменение терапии и лечение сопутствующих заболеваний, применение немедикаментозных методов лечения ХСК, обучение пациента.
- *Коррекция терапии*: при неадекватном контроле симптомов – увеличение объема ФТ – подъем на следующую ступень вверх; при полном контроле симптомов в течение трех – шести месяцев – снижение объема ФТ – переход на ступень вниз; при развитии значимых побочных эффектов замена препаратов или схемы ФТ.

Решение повышать (step up), или понижать (step down), или оставлять без изменений назначенную терапию клиницисты принимают на основании баллов UCT и АЕСТ. UCT в пределах 12–16 баллов отражает хорошо контролируемое заболевание. Если симптомы ХСК отсутствуют в течение трех – шести месяцев (балл UCT = 16), объем терапии снижают посредством уменьшения дозы и/или увеличения интервалов (step down). При UCT < 12 в течение трех месяцев объем терапии повышают (step up). Оценка 10 баллов и выше по тесту АЕСТ отражает хороший уровень контроля ХСК с ангиоотечкой.

Заключение

Антигистаминные препараты II поколения и омализумаб являются единственными зарегистрированными в настоящее время препаратами для лечения ХСК. Современный уровень клинической медицины указывает на необходимость продолжения изучения новых методов диагностики и лечения ХСК и ХИпК, а также поиска инструментов для оценки динамики заболевания и эффективности проводимой терапии. Исследователи весьма оптимистично оценивают будущее разработок новых лекарственных препаратов для лечения ХСК, так как уже сегодня научные изыскания проходят с использованием нескольких инновационных стратегий, направленных на подавление передачи сигналов, регулирующих активацию и накопление тучных клеток; ингибирование внутриклеточных путей активации и дегрануляции тучных клеток и, наконец, подавление активации тучных клеток посредством связывания с ингибирующими рецепторами [6].



Литература

1. *Gonçalo M., Giménez-Arnau A., Al-Ahmad M. et al.* The global burden of chronic urticaria for the patient and society // *Br. J. Dermatol.* 2021. Vol. 184. № 2. P. 226–236.
2. *O'Donnell B.F., Lawlor F., Simpson J. et al.* The impact of chronic urticaria on the quality of life // *Br. J. Dermatol.* 1997. Vol. 136. № 2. P. 197–201.
3. *Baiardini I., Giardini A., Pasquali M. et al.* Quality of life and patients' satisfaction in chronic urticaria and respiratory allergy // *Allergy.* 2003. Vol. 58. № 7. P. 621–623.
4. *Bernstein J.A., Lang D.M., Khan D.A. et al.* The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update // *J. Allergy Clin. Immunol.* 2014. Vol. 133. № 5. P. 1270–1277.
5. *Fricke J., Ávila G., Keller T. et al.* Prevalence of chronic urticaria in children and adults across the globe: systematic review with meta-analysis // *Allergy.* 2020. Vol. 75. № 2. P. 423–432.
6. *Maurer M., Eyerich K., Eyerich S. et al.* Urticaria: Collegium Internationale Allergologicum (CIA) Update 2020 // *Int. Arch. Allergy Immunol.* 2020. Vol. 181. № 5. P. 321–333.
7. *Zuberbier T., Aberor W., Asero R. et al.* The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria. The 2017 Revision and Update // *Allergy.* 2018. Vol. 73. № 7. P. 1393–1414.
8. *Zuberbier T., Hamzah A., Latiff A. et al.* The international EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticarial // *Allergy.* 2021. Online ahead of print. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34536239/>
9. Клинические рекомендации по крапивнице. М.: Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов и Российское общество дерматовенерологов и косметологов, 2018.
10. *Kontou-Fili K., Paleologos G., Herakleous M.* Suppression of histamine-induced skin reactions by loratadine and cetirizine diHCl // *Eur. J. Clin. Pharmacol.* 1989. Vol. 36. № 6. P. 617–619.
11. *Zuberbier T., Munzberger C., Hausteiner U. et al.* Double-blind crossover study of high-dose cetirizine in cholinergic urticaria // *Dermatology.* 1996. Vol. 193. № 4. P. 324–327.
12. *Staevska M., Popov T.A., Kralimarkova T. et al.* The effectiveness of levocetirizine and desloratadine in up to 4 times conventional doses in difficult-to-treat urticaria // *J. Allergy Clin. Immunol.* 2010. Vol. 125. № 3. P. 676–682.
13. *Giménez-Arnau A., Izquierdo I., Maurer M.* The use of a responder analysis to identify clinically meaningful differences in chronic urticaria patients following placebo-controlled treatment with rupatadine 10 and 20 mg // *J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol.* 2009. Vol. 23. № 9. P. 1088–1091.
14. *Guillen-Aguinaga S., Jauregui Presa I., Aguinaga-Ontoso E. et al.* Updosing non-sedating antihistamines in patients with chronic spontaneous urticaria: a systematic review and meta-analysis // *Br. J. Dermatol.* 2016. Vol. 175. № 6. P. 1153–1165.
15. *Metz M., Vadasz Z., Kocatiirk E., Giménez-Arnau A.M.* Omalizumab up-dosing in chronic spontaneous urticaria: an overview of real-world evidence // *Clin. Rev. Allergy Immunol.* 2020. Vol. 59. № 1. P. 38–45.
16. *Wood R., Khan D.* AAAAI response to the EAACI/GA²LEN/EDE/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria revision // *Allergy.* 2018. P. 412–413.
17. *Novak Z., Yanez A., Kiss I. et al.* Safety and tolerability of bilastine 10 mg administered for 12 weeks in children with allergic diseases // *Pediatr. Allergy Immunol.* 2016. Vol. 27. № 5. P. 493–498.
18. *Church M.K., Tiongo-Recto M., Ridolo E., Novák Z.* Bilastine: a lifetime companion for the treatment of allergies // *Curr. Med. Res. Opin.* 2020. Vol. 36. № 3. P. 445–454.

Modern Approaches to the Treatment of Chronic Urticaria

O.V. Sebekina, PhD

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education

Contact person: Oksana V. Sebekina, sebekin1@mail.ru

The article presents up-to-date data on chronic spontaneous urticaria in the light of updated recommendations of international scientific societies of allergologists - immunologists. First-line drugs of therapy - non-sedative H₁-antihistamines of the second generation are characterized by equi-efficacy and differences in pharmacokinetics and safety. Bilastin is a modern representative of H₁-antihistamines of the second generation with the rapid onset and long-lasting effect, characterized by the absence of significant hepatic metabolism. The reliable safety profile when used even at doses four times higher than therapeutic doses gives grounds to recommend bilastin as the drug of choice for comorbid patients and the elderly, as well as children.

Key words: chronic spontaneous urticaria, updated urticaria guidelines, H₁-antihistamines, bilastin



Новые возможности терапии тяжелого атопического дерматита у взрослых

Е.В. Передкова, к.м.н., О.В. Себекина, д.м.н., Н.М. Ненашева, д.м.н., проф., М.Ю. Передельская

Адрес для переписки: Оксана Владимировна Себекина, sebekin1@mail.ru

Для цитирования: Передкова Е.В., Себекина О.В., Ненашева Н.М., Передельская М.Ю. Новые возможности терапии тяжелого атопического дерматита у взрослых // Эффективная фармакотерапия. 2021. Т. 17. № 42. С. 12–24.

DOI 10.33978/2307-3586-2021-17-42-12-24

Атопический дерматит (АтД) является большой современной не только медицинской, но и социальной проблемой во всем мире. Эпидемиологические исследования, проведенные в разных странах, показывают высокую распространенность заболевания. АтД значительно влияет на качество жизни не только пациентов, но и членов их семей и создает много социально-экономических проблем. Атопический дерматит – представитель иммуноопосредованных, Т2-ассоциированных заболеваний. Интерлейкин (ИЛ) 4 и ИЛ-13 играют ключевую роль в Т2-воспалении, активируя различные медиаторы, типы клеток, способствуя выработке специфических IgE антител В-лимфоцитами. Приведены основные клинические характеристики болезни, диагностический алгоритм, принципы лечения. Выбор оптимальной терапии исходя из патогенеза заболевания – важная задача для клинициста. Такое лечение отвечает требованиям персонафицированной медицины. Биологические препараты – группа лекарственных средств, обеспечивающих точечное воздействие на звенья патогенеза заболевания. Одно из показаний для назначения дупилумаба (моноклонального антитела, направленного на блокаду сигнального пути ИЛ-4 и ИЛ-13) – среднетяжелый и тяжелый атопический дерматит. Представлен клинический случай тяжелого АтД, торпидного к традиционным методам лечения. Даны обоснования для назначения дупилумаба в конкретной клинической ситуации. Промежуточный анализ применения дупилумаба у пациента показал клиническую эффективность, которая проявилась в регрессе симптоматики, уменьшении объема традиционной терапии.

Ключевые слова: *тяжелый атопический дерматит, интерлейкин-4, интерлейкин-13, биологическая терапия, дупилумаб*

Введение

Распространенность аллергических заболеваний (АЗ) в мире чрезвычайно высока, 150 млн человек только в Европе имеют тот или иной вид аллергии, 30% европейцев страдают аллергическим ринитом и конъюнктивитом, 20% – бронхиальной астмой, 15% – кожными аллергическими заболеваниями [1]. Атопический дерматит (АтД) – одно из распространенных аллергических заболеваний, встречающееся во всех странах, у лиц обоего пола и в разных возрастных группах, его частота достигает 20–40% в структуре кожных заболеваний [2]. Распространенность АтД среди детского населения составляет 20%, среди взрослого населения – 2–8% [3].

В клинической практике нередко встречается сочетание аллергических заболеваний: бронхиальной астмы,

аллергического ринита, АтД [4]. Сегодня известно, что эти заболевания имеют общую патогенетическую основу – Т2-воспаление, ключевую роль в котором играют интерлейкины (ИЛ) 4, 5 и 13 [5, 6]. Общностью патогенеза обусловлена ассоциация АтД с респираторной аллергией – аллергическим ринитом и бронхиальной астмой.

Понятие и эпидемиология атопического дерматита

Атопический дерматит – многофакторное генетически детерминированное воспалительное заболевание кожи, характеризующееся зудом, хроническим рецидивирующим течением, возрастными особенностями локализации и морфологии очагов поражения [3]. В развитии АтД играют роль генетические факторы: наличие мутации гена филагтрина, нарушение функции эпидермального барьера. Значение также имеет



семейный анамнез аллергических заболеваний [7]. Развитие воспалительной реакции в коже происходит с участием Т-лимфоцитов. В острой фазе заболевания стимуляция Th2-клеток приводит к гиперпродукции иммуноглобулина (Ig) E, хронической – иммунный ответ переключается с Th2 на Th1 [8].

Атопический дерматит развивается у 80% детей, если оба родителя страдают этим заболеванием, и более чем у 50% детей – если болен один родитель. При этом риск развития заболевания увеличивается в полтора раза, если больна мать.

Раннее начало АтД (в возрасте от двух до шести месяцев) отмечается у 45% пациентов, в течение первого года жизни – у 60%. Спонтанная ремиссия заболевания к семи годам наблюдается у 65%, а к 16 годам – у 74% детей с АтД.

Нередко у пациентов с АтД наблюдается последовательное развитие других атопических заболеваний – аллергического ринита и бронхиальной астмы, так называемого атопического марша. Существует взаимосвязь между степенью тяжести АтД и развитием респираторных АЗ: у 20% детей со среднетяжелым течением и 60% с тяжелым течением могут присоединяться симптомы бронхиальной астмы и аллергического ринита [9]. Доказана роль аллергии к клещам домашней пыли, энтеротоксинам золотистого стафилококка, плесневым грибам, а также IgE-аутореактивности в механизмах развития заболевания [10].


Патогенез атопического дерматита

Кожа человека выполняет множество функций, в частности барьерную, направленную на предотвращение потери влаги и проникновение инфекционных или токсических веществ. Кожа является вторым органом по численности микроорганизмов. При этом показано, что плотность микробиома кожи составляет 1 млн бактерий на 1 см² кожного покрова [11]. Микробиом обозначает совокупность микроорганизмов, объединенных одним органом или анатомической зоной. Кожа состоит из ряда ниш, которые колонизируются различными микроорганизмами [12]. Кожный барьер и микробиота защищают организм от внешних воздействий. Этот процесс сбалансирован, но на него постоянно влияют внутренние и внешние факторы, изменяющие состав микробиома и барьерную функцию кожи [11]. Микробиота кожи участвует в формировании иммунного ответа. В коже больных АтД дендритных клеток (клеток Лангерганса) значительно больше, чем у здоровых людей. Дендритные клетки (ДК) презентуют антигены CD4+ Th2-лимфоцитам, которые активизируются и синтезируют цитокины ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-32, фактор некроза опухоли (ФНО) альфа при снижении секреции ИЛ-10, ФНО-гамма. При хронизации воспаления активизируются и Th1-, Th17-, Th22-клетки [3]. В поздней фазе аллергической реакции под действием ИЛ-5, ИЛ-6, ИЛ-8 усиливается миграция эозинофилов и макрофагов в очаг воспаления. Ключевыми

цитокинами, вовлеченными в патофизиологические механизмы АтД, являются ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13, ИЛ-31 и интерферон (ИФН) гамма. На сегодняшний день доказана патогенетическая роль ИЛ-4 в развитии аллергенспецифических IgE-опосредованных реакций при АтД, которая заключается в переключении синтеза антител на IgE. ИЛ-4 и ИЛ-13 связываются с общей субъединицей рецептора и имеют схожие биологические функции [13].

В результате зуда кожи при ее травматизации из кератиноцитов дополнительно высвобождаются нейрорепептиды и провоспалительные цитокины, усиливающие воспаление. В патогенезе АтД особая роль отводится барьерной функции клеток кожи. Филаггрин является ключевым структурным белком, отвечающим за функцию клеток кожи. Образующиеся полимеры профилаггрина дефосфорилируются, расщепляются с образованием мономеров филаггрина, способствующих поддержанию естественного увлажняющего фактора (группа метаболитов) и pH кожи, а также трансформации кератиноцитов в корнеоциты кожи [14]. Мутации в гене, кодирующем филаггрин, образуют усеченные полимеры профилаггрина, приводящего к нарушению морфологии кератиноцитов [15]. Как следствие – снижается барьерная функция кожи и повышается проницаемость для аллергенов окружающей среды (рис. 1) [5, 16].

В исследованиях показаны отличия микробиома кожи пациента с АтД от микробиома кожи здорового человека [17]. Продемонстрирована важная роль *Staphylococcus aureus* в развитии порочного круга АтД. Он способствует поддержанию воспаления и рецидивирующему течению АтД. Как известно, золотистый стафилококк (*S. aureus*) относится к условно-патогенной микрофлоре, однако при определенных условиях способен не только вызывать развитие вторичной инфекции на коже, но и поддерживать бактериальную сенсibilизацию и гиперпродукцию IgE. Золотистый стафилококк у 80–95% больных АтД является доминирующим микроорганизмом среди



ТСЛП – тимусный стромальный лимфопоэтин. ДК – дендритная клетка.

Рис. 1. Современная концепция патогенеза атопического дерматита



определяемых на пораженных участках кожи и у 70–75% больных на коже, свободной от высыпаний [17]. Хотя ведущую роль в механизмах развития осложненных форм АтД отводят *S. aureus*, у больных АтД могут развиваться и стрептодермии, вызванные гемолитическим стрептококком группы В (*S. pyogenes*), и смешанные стрепто-стафилодермии (обычно ассоциация золотистого стафилококка и гемолитического стрептококка), реже – пиодермии, обусловленные грамотрицательной флорой – синегнойной палочкой (*Pseudomonas aeruginosa*), обыкновенным протеом (*Proteus vulgaris*) [17].

Инфекционные агенты участвуют также в развитии и поддержании хронического аллергического воспаления кожи при АтД. Как правило, такое заболевание характеризуется частыми рецидивами, тяжелым течением и рефрактерностью к общепринятой терапии, что обосновывает необходимость назначения больным антимикробных средств.

Таким образом, микробная колонизация и суперинфекция кожи могут играть значимую роль в обострениях АтД.

Клинические проявления atopического дерматита

Клинические проявления АтД в разные возрастные периоды различны. Основные различия заключаются в локализации очагов поражения и соотношении экссудативных и лихеноидных компонентов высыпаний.

Атопический дерматит обычно развивается в первые месяцы жизни, принимая рецидивирующее течение с чередованием обострений, разных по длительности и ремиссии (полной или неполной).

Клиническая классификация АтД включает возрастные периоды болезни, стадии заболевания, распространенность кожного процесса и степень его тяжести [3].

Возрастные периоды болезни:

- ✓ I – младенческий (до двух лет);
- ✓ II – детский (от двух до 13 лет);
- ✓ III – подростковый и взрослый (от 13 лет и старше).

Младенческий период АтД обычно начинается с двух-трех месяцев жизни ребенка. В это время преобладает экссудативная форма заболевания, при которой воспаление носит острый или подострый характер. Отмечаются симметричные эритематозные, папуло-везикулезные высыпания на коже лица и волосистой части головы, экссудация с образованием чешуйкокорок. Впоследствии высыпания распространяются на кожу наружной поверхности голени, предплечий, туловища и ягодиц, а также могут появляться в естественных складках кожи. Дермографизм обычно красный или смешанный. Субъективно отмечается зуд кожных покровов различной интенсивности. К концу указанного периода очаги сохраняются преимущественно в локтевых и подколенных сгибах, а также в области запястий и шеи. Обострения заболевания в значительной степени связаны с алиментарными факторами. Младенческий период АтД

обычно завершается ко второму году жизни ребенка клиническим выздоровлением (у 60% пациентов) или переходит в следующий период (детский).

Детский период АтД характеризуется высыпаниями, которые носят менее экссудативный характер, чем в младенческом периоде, и представлены воспалительными милиарными и/или лентикулярными папулами, папуло-везикулами и эритематозно-сквамозными элементами, локализующимися на коже верхних и нижних конечностей, в области запястий, предплечий, локтевых и подколенных сгибов, голеностопных суставов и стоп. Характерно наличие зудящих узелков, эрозий и эксфолиаций, а также незначительная эритема и инфильтрация в области высыпаний на коже туловища, верхних и нижних конечностей, реже – на коже лица. Дермографизм становится розовым, белым или смешанным. Появляются пигментация век, дисхромии, нередко – ангулярный хейлит.

Подростковый и взрослый период АтД характеризуется высыпаниями преимущественно на сгибательной поверхности конечностей (в области локтевых и коленных сгибов, сгибательных поверхностей голеностопных и лучезапястных суставов), на задней поверхности шеи, в заушных областях. Высыпания представлены эритемой, папулами, шелушением, инфильтрацией, лихенификацией, множественными эксфолиациями и трещинами. В местах разрешения высыпаний в очагах поражения остаются участки гипо- или гиперпигментации. Со временем у большинства пациентов кожа очищается от высыпаний, пораженными остаются лишь подколенные и локтевые сгибы. Возможны гиперлинеарность ладоней и подошв, фолликулярный гиперкератоз («роговые») папулы на боковых поверхностях плеч, предплечий, локтей), хейлит, экзема сосков, складки на передней поверхности шеи. Наблюдается гиперпигментация кожи периорбитальной области, появляются складки под нижним веком (линии Денни – Моргана). Отмечается повышенная сухость кожи. Дермографизм белый стойкий или смешанный. Зуд выраженный, постоянный, реже – приступообразный. Нередко у подростков и взрослых преобладает лихеноидная форма заболевания, которая характеризуется сухостью, выраженным рисунком, отеком и инфильтрацией кожных покровов, крупными, сливающимися очагами лихенизации кожи и упорным стойким зудом. Относительно редко наблюдается пруригинозная форма заболевания с характерными высыпаниями в виде множественных изолированных плотных отежных папул, на вершине которых иногда появляются мелкие пузырьки. Очаги поражения могут иметь распространенный характер с преимущественной локализацией на коже конечностей. Наиболее тяжелым проявлением АтД считается эритродермия, которая характеризуется универсальным поражением кожных покровов в виде эритемы, инфильтрации, лихенификации, шелушения и сопровождается симптомами интоксикации и нарушением терморегуляции (гипертермия, озноб, лимфаденопатия).



Выделяют следующие стадии болезни:

✓ обострения (может быть фаза выраженных или умеренных клинических проявлений);

✓ ремиссии (может быть неполная и полная ремиссия).

По распространенности кожный процесс бывает:

✓ локализованным/ограниченным (площадь поражения кожи < 10%, локализация: локтевые и/или подколенные складки, кожа кистей рук, кожа шеи и/или лица);

✓ распространенным (площадь поражения кожи 10–50%: частично поражена кожа груди, спины; помимо локтевых и подколенных складок в процесс вовлекаются другие участки кожи конечностей (плечи, предплечья, голени, бедра));

✓ диффузным (площадь поражения кожи > 50%, локализация: кожа всего тела, волосистая часть головы).

Известны три степени тяжести кожного процесса. Легкое течение заболевания характеризуется преимущественно ограниченно-локализованными проявлениями кожного процесса, незначительным кожным зудом, редкими обострениями (реже одного-двух раз в год), продолжительностью рецидива до одного месяца, преимущественно в холодное время года. Длительность ремиссии – 8–10 месяцев и более. Отмечается хороший эффект от проводимой терапии. При среднетяжелом течении имеет место распространенный характер поражения. Частота обострений – три-четыре раза в год с увеличением их продолжительности. Длительность ремиссий составляет 2–3 месяца. Процесс приобретает упорное течение с незначительным эффектом от проводимой терапии. При тяжелом течении заболевания кожный процесс носит распространенный или диффузный характер с длительными обострениями, редкими и непродолжительными ремиссиями (частота обострений – пять раз в год и более, длительность ремиссии – 1–1,5 месяца). Лечение приносит кратковременное и незначительное улучшение. Выраженный зуд приводит к нарушению сна.

Рассматривают два основных фенотипа АтД.

Аллергический (экзогенный). Большинство пациентов (80–90%) имеют аллергическую форму АтД, для которой характерны:

✓ отягощенный atopический анамнез;

✓ связь с экзоаллергенами и респираторной аллергией;

✓ положительные кожные тесты с аллергенами;

✓ повышенный уровень sIgE у большей части больных.

Неаллергический (эндогенный). Такая форма АтД встречается реже – в 10–20% случаев, причем в основном у женщин. Сенсибилизация к экзоаллергенам не выявляется (нормальный уровень sIgE и отрицательные кожные тесты), как правило, признаки респираторной аллергии отсутствуют.

К неспецифическим факторам, вызывающим обострение АтД, относят:

■ ирританты (горячая вода, избыточно хлорированная вода, моющие средства с щелочным рН, мочалки, стиральные порошки и отбеливатели, шерстяная и синтетическая одежда, тугая одежда, чистящие и дезинфицирующие средства, профессиональные

химические агенты, в том числе производственный дым и запахи, контакт с соком свежих овощей и фруктов (томаты, цитрусовые, клубника);

■ климатические и температурные;

■ психологические;

■ эндокринные;

■ профессиональные;

■ вирусные инфекции.

Течение АтД может осложниться присоединением вторичной инфекции (бактериальной, микотической или вирусной), что указывает на нарушение противомикробной защиты. На фоне АтД нередко возникает доброкачественная лимфоаденопатия (увеличение лимфатических узлов в шейной, подмышечной, паховой и бедренной областях). Рецидивирующий кератоконъюнктивит, хронический конъюнктивит, в тяжелых случаях – эктропион, формирование ранней катаракты, кератоконус – осложнения АтД со стороны глаз. Грозным осложнением АтД является эритродермия. При тяжелом течении АтД возникают различные психологические проблемы. В ряде случаев у детей с тяжелым АтД наблюдается отставание в росте.

Диагностика atopического дерматита

В диагностике АтД большую роль играют жалобы, анамнез пациента, которые позволяют оценивать характер течения заболевания, сроки его начала, наличие сопутствующих atopических заболеваний. Необходимо оценить влияние факторов, провоцирующих обострения дерматита, а также обратить внимание на склонность пациента к развитию бактериальных, вирусных и грибковых инфекций кожи. Важной может оказаться информация о наличии atopии у родственников пациента. Такой анализ позволяет оценить соответствие данных анамнеза основным и дополнительным диагностическим критериям АтД по J.M. Hanifin и G. Rajka [18].

Для диагностики АтД у пациентов всех возрастных групп используют диагностические критерии J.M. Hanifin и G. Rajka [18].

Чтобы поставить диагноз АтД, требуется наличие трех основных и не менее трех дополнительных критериев. Основные диагностические критерии АтД:

■ зуд кожи;

■ типичная морфология высыпаний и локализация (дети первых лет жизни: эритема, папулы, микро-везикулы с локализацией на лице и разгибательных поверхностях конечностей; дети старшего возраста и взрослые: папулы, лихенификация симметричных участков сгибательных поверхностей конечностей);

■ ранняя манифестация первых симптомов;

■ хроническое рецидивирующее течение;

■ наследственная отягощенность по atopии.

Дополнительные критерии (позволяют заподозрить АтД, но являются неспецифическими):

■ ксероз;

■ положительные кожные тесты с аллергенами;

■ ладонная гиперлинейность и усиление рисунка («atopические» ладони);



- стойкий белый дермографизм;
- экзема сосков;
- рецидивирующий конъюнктивит;
- продольная суборбитальная складка (линия Денни – Моргана);
- периорбитальная гиперпигментация;
- кератоконус (коническое выпячивание роговицы в ее центре).

Результаты показателей клинического, биохимического анализов крови важны как для диагностики АтД, так и для оценки сопутствующих заболеваний и состояний.

Повышение содержания общего и специфических IgE в сыворотке крови служит дополнительным диагностическим критерием АтД [19].

Кожное тестирование с экзоаллергенами проводится в отсутствие противопоказаний. Объем аллергологического обследования определяет аллерголог-иммунолог [20].

В ряде случаев для дифференциальной диагностики АтД с другими дерматозами у взрослых пациентов требуется проведение прижизненного патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) материала кожи [21].

Дерматоскопия – еще один из приемов дифференциальной диагностики кожного процесса.

Для оценки степени тяжести атопического дерматита на момент осмотра используется показатель IGA (Investigators' Global Assessment, глобальная оценка врача-исследователя). Поражение кожи оценивается визуально и пальпаторно. IGA представляет собой оценку по пятибалльной шкале от 0 до 4 баллов и отражает выраженность эритемы, утолщения (уплотнения) кожи и шелушения. 0 баллов соответствуют чистой коже, 4 балла (максимальная оценка) – АтД тяжелой степени [3].

В практике используется шкала SCORAD (Scoring of Atopic Dermatitis, шкала атопического дерматита). Индекс SCORAD предназначен для оценки степени

тяжести АтД. SCORAD предусматривает балльную оценку шести объективных симптомов: эритемы, отека/папулезных элементов, корки/мокнущия, эксфолиации, лихенификации/шелушения, сухости кожи. Интенсивность каждого признака оценивается по четырехуровневой шкале: 0 – отсутствие, 1 – слабая, 2 – умеренная, 3 – сильная [3].

Индекс SCORAD рассчитывается по формуле:

$$SCORAD = A/5 + 7B/2 + C,$$

где А – распространенность поражения кожи;

В – сумма уровней интенсивности клинических симптомов АтД;

С – сумма оценок субъективных нарушений по визуальной аналоговой шкале.

На линейке внизу рисунка указывается точка, соответствующая степени выраженности оцениваемого субъективного признака, усредненное за последние трое суток. Значения индекса могут варьироваться в пределах от 0 (нет заболевания) до 103 (максимально тяжелое течение АтД).

Атопический дерматит легкой степени тяжести соответствует SCORAD < 25, средней степени – SCORAD от 25 до 50, тяжелой – SCORAD > 50.

Принципы терапии атопического дерматита

Основные цели терапии АтД:

- уменьшение клинических проявлений заболевания;
- снижение частоты обострений;
- повышение качества жизни больных;
- предотвращение инфекционных осложнений.

Необходимость избегать триггерных факторов – единая рекомендация для всех пациентов с АтД.

Лечение должно быть комплексным с учетом патогенетических особенностей IgE-зависимого и IgE-независимого механизма развития АтД, коморбидных состояний и заболеваний у конкретного больного.

Общие рекомендации для пациентов с АтД (рис. 2):

- элиминационные мероприятия (контроль окружающей среды и др.);
- диета с учетом индивидуальных особенностей и спектра пищевой сенсибилизации;
- увлажнение кожи. Восстановление водно-липидного слоя и барьерной функции кожи;
- местная и системная фармакотерапия;
- коррекция сопутствующих заболеваний и состояний;
- обучение родителей и больного;
- реабилитация.

Согласно Европейским рекомендациям 2018 г., используется принцип ступенчатой терапии АтД (рис. 3) [22].

Независимо от формы, степени тяжести АтД все пациенты должны применять эмоленты, обеспечивающие увлажнение и смягчение кожи.

Выбор конкретного эмолента и его формы (лосьон, крем, мазь, моющие средства, средства для ванн) осуществляется индивидуально. Для достижения клинического эффекта необходимо использовать достаточный объем смягчающих средств, применять




Рис. 2. Алгоритм терапии атопического дерматита



постоянно (не менее трех-четырёх раз в день) как самостоятельно, так и после водных процедур [23].

Наружная терапия АтД включает в себя топические глюкокортикостероиды (ГКС), топические ингибиторы кальциневрина, препараты цинка. При выраженной инфильтрации назначают линимент нафталанской нефти [24]. Общие рекомендации по использованию местной противовоспалительной терапии основаны на трех принципах – достаточной силе, достаточной дозе и адекватном применении.

Топические ГКС. Существуют разные способы применения топических ГКС:

- интермиттирующий (чередование топических ГКС и нестероидных средств наружной терапии);
- ступенчатый (поочередное нанесение топических ГКС на различные участки кожного поражения);
- нисходящий или нисходящий интермиттирующий (переход с более сильного топического ГКС на более слабый или их чередование);
- штриховой (использование топического ГКС при большой площади поражения).

Комбинированные ГКС, содержащие антибактериальные и/или антимикотические компоненты, показаны только при клиническом и/или лабораторном подтверждении бактериальной и/или грибковой инфекции.

Топические ингибиторы кальциневрина. В международных согласительных документах по атопическому дерматиту ингибиторы кальциневрина в ряде случаев рассматриваются как альтернативная терапия топическим ГКС. Они рекомендуются для использования в качестве терапии второй линии для краткосрочного или интермиттирующего лечения у пациентов с АтД, которые имеют противопоказания или не отвечают на топические ГКС.

Топические ингибиторы кальциневрина – клеточно-селективные ингибиторы воспалительных цитокинов, которые действуют преимущественно на Т-лимфоциты, препятствуют образованию и высвобождению воспалительных цитокинов, таких как ИЛ-2, ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-10, ИФН-гамма, гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующий фактор, ФНО, предотвращают пролиферацию Т-лимфоцитов, препятствуют высвобождению медиаторов воспаления (гистамин, триптаза, ФНО) из активированных тучных клеток [3].

Указанные препараты обладают высоким сродством к коже, избирательно воздействуя на кожное воспаление, проникают глубоко в эпидермис, вместе с тем характеризуются минимальной способностью к всасыванию, не влияя на синтез коллагена и тем самым не вызывают атрофию кожи.

Системная терапия атопического дерматита

Недавние успехи в изучении иммунопатогенеза АтД послужили толчком к разработке таргетных методов лечения, что ознаменовало начало новой эры в лечении тяжелых форм АтД [25]. Дупилумаб – новая перспективная возможность лечения Т2-ассоциированных

Тяжелый АтД (SCORAD > 50) или персистирующие симптомы	Госпитализация, системные иммуносупрессанты: циклоспорин А, короткий курс пероральных глюкокортикостероидов, метотрексат, азатиоприн, микофенолата мофетин, ПУВА-терапия, генно-инженерные биологические препараты (дупилумаб)
---	--

Средний АтД (SCORAD 25–50) или рецидивирующие симптомы	Проактивная терапия такролимусом или топическими глюкокортикостероидами 2-го или 3-го класса с влажными повязками, фототерапия, климатотерапия, психосоматическая поддержка
--	---

Легкий АтД (SCORAD < 25) или преходящие симптомы	Реактивная терапия топическими глюкокортикостероидами 2-го класса или в зависимости от локальных кофакторов топические ингибиторы кальциневрина, антисептики, содержащие серебро
--	--

Базовое лечение	Образовательные программы, эмоленты, ванны с маслами, избегание аллергенов (если таковые выявлены при тестировании) и триггеров
-----------------	---

Рис. 3. Терапия АтД согласно европейским рекомендациям

аллергических заболеваний, таких как бронхиальная астма, АтД, полипозный риносинусит.

Пациентам с тяжелым течением АтД при невозможности применения биологической терапии или обострении рекомендуются системные ГКС перорально по схеме, доступной в национальных клинических рекомендациях по АтД [3]. В отдельных случаях назначают ГКС в инъекционных формах.

При тяжелом АтД у взрослых и в отсутствие противопоказаний назначается циклоспорин [3].

Для уменьшения интенсивности кожного зуда используют антигистаминные препараты перорально и парентерально.

Аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) может иметь положительный эффект у некоторых сенсibilизированных пациентов с АтД, лучшие результаты АСИТ продемонстрировала при наличии клеща домашней пыли [26].

У пациентов с респираторными аллергическими заболеваниями (аллергический ринит и легкая аллергическая бронхиальная астма), ассоциированными с АтД, нет противопоказаний для применения АСИТ. Дупилумаб – моноклональное антитело, воздействует на рецептор ИЛ-4-альфа, блокируя тем самым сигнальные пути ИЛ-4 и ИЛ-13. В настоящее время дупилумаб (Дупиксент) одобрен в нашей стране, странах Евросоюза и США для дополнительной поддерживающей терапии бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения у пациентов в возрасте 12 лет и старше с эозинофильным фенотипом или у пациентов с гормональнозависимой бронхиальной астмой, получающих пероральные ГКС, и для лечения среднетяжелого и тяжелого АтД у детей с шести лет, подростков и взрослых при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению, при этом дупилумаб может применяться в монорежиме или



одновременно с топическими лекарственными средствами. Недавно зарегистрировано еще одно показание к терапии дупилумабом при назальном полипозе у взрослых пациентов [27].

ИЛ-4 и ИЛ-13 действуют на различные клетки, участвующие в патогенезе АтД (рис. 4) [5]. Передача сигналов ИЛ-4 индуцирует активацию и дифференцировку как Т2-клеток, так и В-клеток через путь JAK-STAT, а трансформация подкласса В-клеточных иммуноглобулинов приводит к увеличению продукции IgE. Оба цитокина стимулируют рекрутирование эозинофилов, действуют на дифференцировку кера-




ИЛ-4R-альфа – альфа-субъединица рецептора ИЛ-4.

ИЛ-13-R-альфа-1 – альфа-1-субъединица рецептора ИЛ-13. ЯК – янус-киназа.

СТАТ – сигнальный трансдуктор и активатор транскрипции. ТИК – тирозинкиназа.

Рис. 4. Многообразие эффектов ИЛ-4 и ИЛ-13 – ключевых и центральных цитокинов, инициирующих и поддерживающих воспаление 2-го типа



ИЛ-4R-альфа – альфа-субъединица рецептора ИЛ-4.

ИЛ-13-R-альфа-1 – альфа-1-субъединица рецептора ИЛ-13. ЯК – янус-киназа.

СТАТ – сигнальный трансдуктор и активатор транскрипции. ТИК – тирозинкиназа.

Рис. 5. Основной механизм действия дупилумаба

тиноцитов, что приводит к подавлению продукции филагтрина и молекул клеточной адгезии, способствуя тем самым образованию дефектов кожного барьера.

На рисунке 5 представлен основной механизм действия дупилумаба. Связываясь с ИЛ-4R-альфа-субъединицей, общей для рецепторных комплексов ИЛ-4 и ИЛ-13, дупилумаб блокирует сигнальные пути как ИЛ-4, так и ИЛ-13, тормозя активацию янус-киназы/сигнального трансдуктора и активатора транскрипции и приводя к уменьшению каскада воспаления, опосредованного Т2-клетками. Блокирование пути передачи сигналов ИЛ-4/ИЛ-13 дупилумабом у пациентов снижает концентрации многих медиаторов Т2-воспаления, включая иммуноглобулин Е, периостин и множественные провоспалительные цитокины и хемокины (например, эотаксин, тимус-ассоциированный регуляторный хемокин), а также уровень фракции оксида азота в выдыхаемом воздухе (FeNO) – маркер эозинофильного воспаления в легких. В исследовании J.D. Hamilton показано, что дупилумаб нормализует экспрессию воспалительных молекул Т2-воспаления, что приводит к редуцированию кожного воспаления и восстановлению кожного барьера. Исследователи проанализировали экспрессию генов поврежденной и неповрежденной кожи до и после лечения дупилумабом [28]. Биопсия кожи была получена у 18 взрослых пациентов с АтД от средней до тяжелой степени, которые участвовали в двух клинических исследованиях I фазы эффективности дупилумаба (150 или 300 мг дупилумаба или плацебо один раз в неделю в течение четырех недель). Степень тяжести заболевания, оцененная по индексу экземы (EASI), значительно улучшилась у пациентов, получавших дупилумаб, по сравнению с пациентами, принимавшими плацебо.

Таким образом, введение дупилумаба влияет на экспрессию генов у пациентов с АтД через активацию структурных белков, белков липидного метаболизма и белков кожного барьера, а также подавление медиаторов воспаления и маркеров эпидермальной пролиферации. Указанные изменения завершаются нормализацией кожной структуры [25].

Эффективность дупилумаба

Результаты исследований эффективности дупилумаба подтверждены идентичными 16-недельными рандомизированными плацебоконтролируемыми исследованиями фазы III SOLO1 (NCT02277743) и SOLO2 (NCT02277769) [29]. Оба исследования включали взрослых пациентов (671 – в SOLO1 и 708 – в SOLO2) с АтД от умеренной до тяжелой степени, недостаточно контролируемым на фоне местного лечения.

Перед исследованиями 33% пациентов получали системные ГКС (как в SOLO1, так и в SOLO2); 25,9% (SOLO1) и 31,4% (SOLO2) использовали системные иммуносупрессанты [29].

В обоих исследованиях были достигнуты все первичные и вторичные конечные точки. Первичной ко-



нечной точкой обоих исследований служила оценка по шкале IGA (Investigator's Global Assessment) (диапазон 0–4) после 16 недель лечения по сравнению с исходной. Проанализированы две ключевые вторичные конечные точки: одна касалась шкалы EASI (Eczema Area and Severity Index)-75 (доля пациентов, достигших 75%-ного снижения по шкале EASI), другая – улучшения зуда (определяемого как снижение на четыре пункта среднего еженедельного значения). В конце исследования монотерапия дупилумабом значительно улучшила признаки и симптомы АТД (зуд, сон и качество жизни) по сравнению с плацебо. CHRONOS – исследование фазы III, направленное на оценку долгосрочного лечения (52 недели) умеренного и тяжелого АТД с применением дупилумаба и сопутствующих местных иммуносупрессоров по сравнению с плацебо [30].

Результаты исследования обобщили предыдущие данные. Клинические показатели, такие как IGA или EASI, значительно улучшились в группах дупилумаба и местных ГКС по сравнению с плацебо.

Следует отметить, что в конце исследования в группах дупилумаба было меньше обострений АТД (13% из тех, кто получал его раз в неделю, и 14% у пациентов, получавших препарат раз в две недели, по сравнению с 41% пациентов группы плацебо; $p < 0,001$). Исследование CHRONOS продемонстрировало, что лечение дупилумабом (300 мг один раз в неделю или раз в две недели) снижает использование топических глюкокортикостероидов, а также системной терапии ГКС в первые 16 недель по сравнению с плацебо.

Безопасность дупилумаба

Все клинические исследования показали, что дупилумаб безопасен и хорошо переносится. Большинство побочных эффектов были легкими или умеренными и временными. Наиболее частым побочным эффектом у пациентов, получавших дупилумаб, была реакция в месте инъекции в виде преходящей эритемы или отека.

Конъюнктивит также отмечался в качестве побочного эффекта, связанного с применением дупилумаба [31]. Конъюнктивит чаще регистрировался в группе дупилумаба (2–11%), чем в группе плацебо (3%). Во всех исследованиях фазы III пациенты, получавшие дупилумаб, имели более значимые проявления конъюнктивита по сравнению с теми, кто получал плацебо. В большинстве случаев симптомы конъюнктивита были от легкой до умеренной степени выраженности и исчезали после местной терапии во время исследования.

Патогенез конъюнктивита, связанного с дупилумабом, остается невыясненным и требует дальнейших исследований.

Частота респираторных инфекций была одинаковой в группах дупилумаба и плацебо.

Головная боль чаще регистрировалась в группе дупилумаба (8–15%) по сравнению с группой плацебо (3%).

Пациенты, получавшие дупилумаб, чаще были инфицированы вирусами герпеса (5–12%) по сравнению с пациентами группы плацебо (2%), но все проявления инфекции были легкими или умеренными.

Следует отметить, что общая частота кожных инфекций была сходной в группах дупилумаба и плацебо. Отмечено небольшое повышение уровня эозинофилов в течение первых 12 недель в группе пациентов, получавших дупилумаб. Остальные лабораторные показатели в обеих группах не различались [29].

Недавно опубликованы результаты длительного применения дупилумаба: на протяжении трех лет у взрослых пациентов и до 52 недель у подростков от 12 лет и старше с среднетяжелым и тяжелым атопическим дерматитом [32]. В этих исследованиях дупилумаб продемонстрировал благоприятный профиль безопасности и устойчивую эффективность, что полностью согласуется с ранее полученными результатами в контролируемых исследованиях.

Показания к применению дупилумаба

Дупилумаб применяют [27]:

- ✓ при АТД среднетяжелого и тяжелого течения у пациентов от шести лет и старше при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению. Препарат дупилумаб (Дуликсент) может применяться в монорежиме или одновременно с топическими лекарственными средствами;
- ✓ в качестве дополнительной поддерживающей терапии бронхиальной астмы среднетяжелого и тяжелого течения у пациентов в возрасте 12 лет и старше с эозинофильным фенотипом или пациентов с гормональнозависимой бронхиальной астмой, получающих пероральные ГКС;
- ✓ в качестве дополнительной поддерживающей терапии взрослых пациентов с плохо контролируемым тяжелым хроническим полипозным риносинуситом.

Режим дозирования дупилумаба

Препарат выпускается в предварительно заполненном шприце, содержащем 200 или 300 мг дупилумаба. Дуликсент (дупилумаб) вводят подкожно.

Рекомендуемая доза препарата дупилумаб у взрослых пациентов с АТД: начальная доза – 600 мг (две инъекции по 300 мг), далее – по 300 мг каждые две недели. В зависимости от индивидуального терапевтического ответа доза может быть увеличена до 300 мг еженедельно.

Рекомендуемая доза препарата дупилумаб у пациентов в возрасте 6–17 лет в зависимости от массы тела:

- ✓ от 15 до < 30 кг: начальная доза – 600 мг (две инъекции по 300 мг), далее по 300 мг каждые четыре недели;
- ✓ от 30 до < 60 кг: начальная доза – 400 мг (две инъекции по 200 мг), далее по 200 мг каждые две недели;
- ✓ 60 кг и более: начальная доза – 600 мг (две инъекции по 300 мг), далее по 300 мг каждые две недели.



Инъекцию препарата может делать либо сам пациент, либо лицо, ухаживающее за ним. Необходимо до начала применения дупилумаба обучить пациентов и/или ухаживающих за ними лиц подготовке и проведению инъекции препарата, согласно указаниям в инструкции по медицинскому применению. Дупилумаб также может применяться у пациентов с сочетанием среднетяжелого и тяжелого атопического дерматита с тяжелой бронхиальной астмой. Выбор терапии, ее объем, продолжительность, кратность применения лекарственных средств определяются лечащим врачом исходя из конкретной клинической ситуации, с учетом ответа на терапию и динамики кожного процесса.

Клинический случай

Пациент А., 24 года, работает курьером.

Жалобы на выраженный кожный зуд, покраснение кожи, высыпания в области конечностей, лица, шеи, груди, спины, обильное шелушение, приступы удушья, купируемые ингаляциями сальбутамола (до трех-четырёх раз в неделю), постоянную заложенность носа.

Анамнез: с трехмесячного возраста – первые симптомы АТД, в возрасте одного года диагностирован распространенный АТД. Обострения АТД несколько раз в год, по поводу которых неоднократно получал лечение в стационарах. С трехлетнего возраста отмечались симптомы ринита, конъюнктивита, которые беспокоили круглый год, с шести лет – приступы удушья при контакте с домашней пылью, кошкой. Через два года – учащение приступов удушья в период с апреля по август. В девятилетнем возрасте обследован аллергологом. Диагностированы бронхиальная астма атопическая форма, аллергический ринит, выявлен спектр сенсibilизации (домашняя пыль, клещи домашней пыли, шерсть кошки, пыльца деревьев, злаковых трав). Назначена базисная терапия астмы (салметерол/флутиказона пропионат 25/250 мкг/доза по два вдоха дважды в сутки), сальбутамол ситуационно, эндоназально мометазона фуруат. На фоне терапии отмечался регресс назальной симптоматики, исчезла потребность в сальбутамоле. С семи лет проявления АТД значительно регрессировали: оставались только сухость кожи, высыпания в области локтевых сгибов, подколенных областей, которые возникали периодически и сопровождалась зудом. Пациент использовал эмоленты, антигистаминные препараты. Нестойкая ремиссия АТД продлилась до 21 года. В течение последних трех лет АТД непрерывно рецидивирует, кожный процесс стал распространенным (лицо, туловище, конечности), сопровождается мучительным кожным зудом. Последнее обострение зафиксировано в сентябре 2020 г. после перенесенной ротавирусной инфекции: усилились гиперемия кожи, кожный зуд, появились обильные макуло-папулезные высыпания, отек в области лица с выраженной сухостью кожи, трещинами, болезненностью. Госпитализирован 6 ноября 2020 г. в аллергологическое отделение.

Аллергологический анамнез. Наследственность: мать пациента страдает поллинозом с клиническими проявлениями риноконъюнктивита, выявлена аллергия к пыльце деревьев. Дед по материнской линии страдал экземой. Старший брат пациента здоров.

Контакт с домашней пылью, шерстью кошки провоцирует приступы удушья.

В сезон пыления деревьев и злаковых трав учащаются приступы удушья и усиливаются симптомы аллергического ринита.

Низкая температура воздуха, физические нагрузки, отрицательные эмоции приводят к обострению кожного процесса.

Прием в пищу продуктов-гистаминолибераторов, употребление алкоголя ухудшают состояние кожи.

Нежелательных реакций на применение лекарственных средств не зафиксировано.

Анамнез жизни. Вредных привычек у пациента нет. Образование среднее техническое, однако последние три года работает курьером. С рождения пациента до шести лет в квартире жила кошка, в течение последних 18 лет домашних животных нет. Проживает с родителями, жилищные условия удовлетворительные. Профессиональных вредностей нет.

Медикаментозное лечение на момент госпитализации: цетиризин 10 мг, наружно мазь мометазона (Элоком), крем Ф99 полужирный, крем декспантенола/хлоргексидина (Бепантен плюс), салметерол/флутиказона пропионат 25/250 мкг/доза по одному вдоху два раза в день, сальбутамол 200 мкг три-четыре раза в неделю, эндоназально мометазона фуруат 200 мкг/сут.

При поступлении состояние средней тяжести. Конституция нормостеническая, удовлетворительного питания. Гиперемия кожи туловища, конечностей в виде эритематозно-макулезных высыпаний, местами сливного характера и обильным лихеноидным шелушением, линейные или прерывистые следы расчесывания в локтевых сгибах, подколенных областях, на тыльной стороне кисти кожа с выраженными участками утолщения и папулами, с обильным лихеноидным шелушением и следами расчесов (рис. 6–8). Кожа лица отечна, гиперемирована (рис. 9), в области подбородка и губ трещины, шелушение, корочки. Общая оценка заболевания по шкале IGA – 4 балла. Индекс SCORAD – 58,8. Индекс EASI [33] – 47,2.

Лимфатические узлы по задней поверхности шеи при пальпации безболезненные, подвижные, мягко-эластичной консистенции. Носовое дыхание слегка затруднено с обеих сторон. Над всей поверхностью легких ясный легочный перкуторный звук. Дыхание везикулярное, выслушиваются сухие единичные хрипы на форсированном выдохе в заднебоковых отделах. Частота дыхательных движений – 16 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сердечных сокращений (ЧСС) – 76 в минуту, артериальное давление – 115/70 мм рт. ст. Язык обложен белым налетом в области корня. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень, селезенка не увеличе-



ны. Стул регулярный, без патологических примесей. Область почек не изменена. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное, цвет мочи желтый без патологических примесей. Щитовидная железа визуально не увеличена, пальпация ее безболезненная.

Лабораторные исследования при поступлении. Общий клинический анализ крови: показатели в пределах нормы.

Клинический анализ мочи: показатели в пределах нормы.

Биохимический анализ крови: показатели в пределах нормы.

В крови иммуноглобулины А, М, G: показатели в пределах нормы.

Уровень С-реактивного белка – 2 мг/л (норма).

Общий IgE – 309 МЕ/л.

Повышены уровни специфических IgE к клещу домашней пыли, шерсти кошки, пыльце деревьев.

Инструментальные исследования. Электрокардиограмма: нарушение процесса реполяризации. ЧСС – 82 в минуту. Спирометрия: жизненная емкость легких – 4,16 л, 78,2%, форсированная жизненная емкость легких – 4,14 л, 81,3%, объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ₁) – 3,64 л, 84,4%, индекс Тиффно – 87,38%, пиковая объемная скорость выдоха – 8,92 л/с, 90,9%, средняя объемная скорость 25/75% – 3,80 л/с, 75,6%. Бронходилатационный тест с салбутамолом (400 мкг) положительный. Прирост ОФВ₁ – 250 мл и 13,47% от исходного значения.

Спиральная компьютерная томография (КТ) легких: КТ-признаков очаговых и инфильтративных изменений в паренхиме легких не выявлено.

Эзофагогастроинтестиноскопия: недостаточность кардии. Признаки хронического рефлюкс-эзофагита. Гастрит смешанного характера с наличием внутрислизистых геморрагий в области свода желудка. Очаговый бульбит. *Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства:* деформация желчного пузыря. *Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез:* патологии не выявлено.

Диагноз: атопический дерматит, распространенная форма, тяжелого течения, стадия обострения. Бронхиальная астма, атопическая форма, средней степени тяжести, персистирующая, частично контролируемая. Аллергический персистирующий ринит средней степени тяжести. Аллергия к клещу домашней пыли, шерсти кошки, пыльце деревьев.

Сопутствующие заболевания: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с рефлюкс-эзофагитом. Хронический гастрит. Хронический бескаменный холецистит.

В стационаре назначена терапия: метилпреднизолон 250 мг внутривенно на 200 мл физиологического раствора пять дней, лоратадин 10 мг внутрь десять дней, омепразол 20 мг внутрь десять дней, топическая терапия, начатая амбулаторно, продолжена. Эффект от проводимого лечения незначительный (отек лица

регрессировал, несколько уменьшилась воспалительная инфильтрация кожи).

Обоснование для назначения дупилумаба. Пациент с младенческого возраста страдает атопическими заболеваниями: с трех месяцев – АтД, через три года присоединился аллергический ринит, позже – атопическая бронхиальная астма. Заболевания имеют



Рис. 6. Трещины, шелушение, корочки в области подбородка и губ



Рис. 7. Кожа на тыльной стороне кисти с выраженными участками утолщения и папулами, обильным лихеноидным шелушением и следами расчесов



Рис. 8. Гиперемия кожи туловища, конечностей в виде эритематозно-макулезных высыпаний



Рис. 9. Отечность кожи лица



Рис. 10. На фоне лечения дупилумабом практически полностью исчезли гиперемия кожи, трещины в области губ



Рис. 11. Улучшение состояния кожи рук



Рис. 12. Уменьшение эксфолиации



Рис. 13. Улучшение состояния кожи ног

персистирующее течение. Последние три года АтД приобрел непрерывно-рецидивирующее течение, несмотря на проводимое лечение. Терапия бронхиальной астмы давала лишь частичный контроль. Лечение, проводимое в настоящее время в стационаре, включая системные ГКС в высокой дозе, недостаточно эффективно. Принято решение о назначении биологической терапии дупилумабом. У пациента имеется показание для назначения такого лечения (АтД среднетяжелого и тяжелого течения у пациентов от шести лет и старше при недостаточном ответе на терапию топическими лекарственными препаратами или в случае, когда такие препараты не рекомендованы к применению; дупилумаб может применяться в монотерапии или одновременно с топическими лекарственными препаратами, как указано в инструкции к применению). Первая инъекция дупилумаба 600 мг подкожно введена в условиях аллергологического отделения 13 ноября 2020 г. Местных и общих реакций на введение препарата не отмечалось. Пациент выписан из стационара 18 ноября. Лечение дупилумабом планировалось продолжить. Существенного регресса симптоматики на момент выписки не зафиксировано. В клиническом анализе крови – эозинофилия 8%, изменений других показателей не отмечено. Повторные инъекции дупилумаба в дозе 300 мг подкожно введены в стационаре 27 ноября, 11 и 25 де-

кабря 2020 г. Нежелательных реакций на введение препарата не зарегистрировано. В первых числах января пациент отметил существенную положительную динамику: практически полностью исчезла гиперемия кожи, зуд возникает лишь при воздействии триггерных факторов (горячая вода), новых высыпаний нет, уменьшились воспалительная инфильтрация кожи, шелушение. Кожа стала более эластичной, исчезли трещины в области губ, значительно меньше беспокоит сухость кожи, эксфолиация почти исчезла (рис. 10–13). Проведена оценка динамики течения заболевания с использованием IGA, SCORAD, EASI. Общая оценка заболевания по шкале IGA – 2 балла (исходно 4 балла), индекс SCORAD – 30,5 (исходно – 55,8), EASI – 18,3 (исходно – 47,2). 11 января 2021 г. биологическая терапия была продолжена, в стационаре провели очередную инъекцию дупилумаба 300 мг, нежелательных реакций (местных и общих) на введение препарата не зарегистрировано. Введение следующей дозы дупилумаба 300 мг запланировано на 25 января 2021 г. Пациент дополнительно использует эмоленты, гель и шампунь серии лечебной косметики Мустела. Продолжена базисная терапия бронхиальной астмы: салметерол/флутиказона пропионат 25/250 мкг/доза два раза в сутки, по поводу аллергического ринита – эндона-



зально мометазон 200 мкг/сут. Больной отметил повышение общего эмоционального фона.

Анализ итогов лечения дупилумабом. Применение биологической терапии позволило достичь клинического эффекта, которого не удавалось получить несколько лет от традиционной фармакотерапии. Значительно уменьшился объем топической терапии АтД, нет дополнительной потребности в антигистаминных препаратах. Пациент использует только эмульнты и средства лечебной косметики. Значительно улучшилось качество жизни, нормализовался сон, повысился эмоциональный фон. Нежелательных эффектов при использовании дупилумаба не зафиксировано. На наш взгляд, промежуточные результаты свидетельствуют о перспективности дальнейшего применения дупилумаба пациентом А.

Заключение

Общие патогенетические механизмы, лежащие в основе Т2-ассоциированных заболеваний, делают перспективным использование биологической терапии моноклональным антителом, направленным против общей субъединицы рецептора ИЛ-4/13, что приводит к подавлению функции ключевых цитокинов, участвующих в Т2-воспалительном ответе.

В России дупилумаб одобрен в 2019 г. и в настоящее время может применяться для дополнительной поддерживающей терапии пациентов в возрасте 12 лет и старше со среднетяжелой и тяжелой бронхиальной

астмой, пациентов с АтД среднетяжелого и тяжелого течения с шести лет и в качестве дополнительной поддерживающей терапии взрослых пациентов с плохо контролируемым тяжелым хроническим полипозным риносинуситом.

Атопический дерматит не является угрожающим жизни заболеванием, но существенно снижает качество жизни пациентов и их окружения, повышает риск пищевой аллергии, астмы, аллергического ринита и других иммуноопосредованных воспалительных заболеваний.

Как и при многих других хронических заболеваниях, плохая приверженность терапии АтД является существенным препятствием для успешного лечения заболевания. Перед назначением любой фармакотерапии пациенты должны быть осведомлены о ее важности, основных принципах действия и возможных неблагоприятных реакциях.

На сегодняшний день дупилумаб – единственный биологический препарат для лечения АтД. Следует рассмотреть его назначение у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением АтД, у которых не удается достигнуть контроля на фоне традиционной фармакотерапии. Дупилумаб показал высокую эффективность и безопасность в терапии АтД у детей, подростков и взрослых.

Выбор оптимальной таргетной терапии, исходя из патогенеза Т2-ассоциированных заболеваний, является стратегически важной задачей и отвечает требованиям персонализированной медицины. 🌟

Литература

1. Akdis C., Papadopoulos N., Cardona V. Fighting allergies beyond symptoms: the European Declaration on Immunotherapy // Eur. J. Immunol. 2011. Vol. 41. № 10. P. 2802–2804.
2. Kowalska-Oleđzka E., Czarnecka M., Baran A. Epidemiology of atopic dermatitis in Europe // J. Drug Assess. 2019. Vol. 8. № 1. P. 126–128.
3. Атопический дерматит. Клинические рекомендации Российского общества дерматовенерологов и косметологов, Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, Союза педиатров России. М., 2020.
4. Кузубова Н.А., Тутова О.Н. Т2-ассоциированные заболевания: в фокусе коморбидный пациент // Медицинский совет. 2020. № 17. С. 57–64.
5. Gandhi N.A., Bennett B.L., Graham N.M. et al. Targeting key proximal drivers of type 2 inflammation in disease // Nat. Rev. Drug Discov. 2016. Vol. 15. № 1. P. 35–50.
6. Muraro A., Lemanske R.F.Jr., Hellings P.W. et al. Precision medicine in patients with allergic diseases: Airway diseases and atopic dermatitis-RACTALL document of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy, Asthma & Immunology // J. Allergy Clin. Immunol. 2016. Vol. 137. № 5. P. 1347–1358.
7. Palmer C.N., Irvine A.D., Terron-Kwiatkowski A. et al. Common loss-of-function variants of the epidermal barrier protein filaggrin are a major predisposing factor for atopic dermatitis // Nat. Genet. 2006. Vol. 38. № 4. P. 441–446.
8. McGirt L.Y., Beck L.A. Innate immune defects in atopic dermatitis // J. Allergy Clin. Immunol. 2006. Vol. 118. № 1. P. 202–208.
9. Hill D.A., Spergel J.M. The atopic march: critical evidence and clinical relevance // Ann. Allergy Asthma Immunol. 2018. Vol. 120. № 2. P. 131–137.
10. Werfel T., Allam J.P., Biedermann T. et al. Cellular and molecular immunologic mechanisms in patients with atopic dermatitis // J. Allergy Clin. Immunol. 2016. Vol. 138. № 2. P. 336–349.
11. Захарова И.Н., Касьянова А.Н. Микробиом кожи: что нам известно сегодня? // Медицинский совет. 2019. № 17. С. 168–176.
12. Заславский Д.В., Барина А.Н. Микробиом кожи при атопическом дерматите и особенности различных средств базисного ухода за кожей // Медицинский совет. 2018. № 2.
13. Gandhi N.A., Pirozzi G., Graham N.M. Commonality of the IL-4/IL-13 pathway in atopic diseases // Expert Rev. Clin. Immunol. 2017. Vol. 13. № 5. P. 425–437.
14. Esaki H., Brunner P.M., Renert-Yuval Y. Early-onset pediatric atopic dermatitis is TH 2, but also TH 17 polarized in skin // J. Allergy Clin. Immunol. 2016. Vol. 138. № 6. P. 1639–1651.



15. Романюк Ф.П. Взгляд педиатра на лечение атопического дерматита с применением метилпреднизолона // Медицинский совет. 2019. № 17. С. 226–234.
16. Noda S., Krueger J.G., Guttman E. The translational revolution and use of biologics in patients with inflammatory skin diseases // J. Allergy Clin. Immunol. 2015. Vol. 135. № 2. С. 324–336.
17. Ларькова И.А. Эффективная терапия атопического дерматита у детей // Медицинский совет. 2016. № 1. С. 162–167.
18. Hanifin J.M., Rajka G. Diagnostic features of atopic dermatitis // Acta Derm. Venereol. 1980. Vol. 92. Suppl. P. 44–47.
19. Eichenfield L.F., Tom W.L., Chamlin S.L. et al. Guidelines of care for the management of atopic dermatitis: section 1. Diagnosis and assessment of atopic dermatitis // J. Am. Acad. Dermatol. 2014. Vol. 70. № 2. P. 338–351.
20. Arbes S.J.Jr., Gergen P.J., Elliott L., Zeldin D.C. Prevalences of positive skin test responses to 10 common allergens in the US population: results from the third National Health and Nutrition Examination Survey // J. Allergy Clin. Immunol. 2005. Vol. 116. № 2. P. 377–383.
21. Клиническая дерматовенерология. В 2 т. / под ред. Ю.К. Скрипкина, Ю.С. Бутова. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
22. Consensus-based European guidelines for treatment of atopic eczema (atopic dermatitis) in adults and children: part II // J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2018. Vol. 32. № 6. P. 850–878.
23. Leung T.N., Chow C.M., Chow M.P. et al. Clinical guidelines on management of atopic dermatitis in children // Hong Kong J. Paediatr. (new series). 2013. Vol. 18. P. 96–104.
24. Dabade T.S., Davis D.M., Wetter D.A. et al. Wet dressing therapy in conjunction with topical corticosteroids is effective for rapid control of severe pediatric atopic dermatitis: experience with 218 patients over 30 years at Mayo Clinic // J. Am. Acad. Dermatol. 2012. Vol. 67. № 1. P. 100–106.
25. Rodrigues M.A., Nogueira M., Torres T. Dupilumab for atopic dermatitis: evidence to date // G. Ital. Dermatol. Venereol. 2019. Vol. 154. № 6. P. 696–713.
26. Agache I., Lau S., Akdis C.A. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: house dust mite-driven allergic asthma // Allergy. 2019. Vol. 74. № 5. P. 855–873.
27. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Дупиксент® РУ № ЛПИ-005440 от 04.04.2019 с изменениями от 12.08.2020.
28. Hamilton J.D. Drug evaluation review: dupilumab in atopic dermatitis // Immunotherapy. 2015. Vol. 7. № 10. P. 1043–1058.
29. Simpson E.L., Bieber T., Guttman-Yassky E. et al. SOLO1 and SOLO2 Investigators. Two phase 3 trials of dupilumab versus placebo in atopic dermatitis // N. Engl. J. Med. 2016. Vol. 375. № 24. P. 2335–2348.
30. Blauvelt A., de Bruin-Weller M., Gooderham M. et al. Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial // Lancet. 2017. Vol. 389. № 10086. P. 2287–2303.
31. Wollenberg A., Ariens L., Thurau S. et al. Conjunctivitis occurring in atopic dermatitis patients treated with dupilumab – clinical characteristics and treatment // J. Allergy Clin. Immunol. Pract. 2018. Vol. 6. № 5. P. 1778–1780.e1.
32. Simpson E.L., Paller A.S., Siegfried E.C. et al. Efficacy and safety of dupilumab in adolescents with uncontrolled moderate to severe atopic dermatitis: a phase 3 randomized clinical trial // JAMA Dermatol. 2020. Vol. 156. № 1. P. 44–56.
33. Hanifin J.M., Thurston M. The Eczema Area and Severity Index (EASI): assessment of reliability in atopic dermatitis. EASI Evaluator Group // Exp. Dermatol. 2001. Vol. 10. № 1. P. 11–18.

New Treatment Options for Severe Atopic Dermatitis in Adults

E.V. Peredkova, PhD, O.V. Sebekina, PhD, N.M. Nenasheva, PhD, Prof., M.Yu. Peredelskaya

Russian Medical Academy of Continuous Professional Education

Contact person: Oksana V. Sebekina, sebekin1@mail.ru

Atopic dermatitis is a now not only large modern medical problem, but also a social problem all over the world. Epidemiological studies carried out in different countries show a high prevalence of the disease. Atopic dermatitis has a significant impact on the quality of life of patients and their family members and creates many negative socio-economic problems. Atopic dermatitis is a representative of immune-mediated, T2-associated diseases. IL-4, IL-13 play a key role in T2 inflammation, activating various mediators, cell types, promoting the production of specific IgE antibodies in B lymphocytes. The main clinical characteristics of the disease, diagnostic algorithm, principles of treatment are considered. The choice of the optimal therapy based on the pathogenesis of the disease is an important task for the clinician. Such treatment meets the requirements of personalized medicine. Biological preparations - a group of drugs that provide a point effect on the links of the pathogenesis of the disease. One of the indications for dupilumab (a monoclonal antibody aimed at blocking the signaling pathway of IL-4 and IL-13) is moderate to severe atopic dermatitis. The article presents a clinical case of severe atopic dermatitis, torpid to traditional methods of treatment. The rationale for the appointment of dupilumab in a specific clinical situation is given. An interim analysis of the use of dupilumab in a patient showed clinical efficacy, which manifested itself in a regression of symptoms, a decrease in the volume of traditional therapy.

Key words: severe atopic dermatitis, IL-4, IL-13, biological therapy, dupilumab

Онлайн-школа, онлайн-семинар, вебинар



Агентство «Медфорум» ведет трансляции на <https://umedp.ru/online-events/> из видеостудий и подключает спикеров дистанционно (из рабочего кабинета, дома). По всем основным направлениям медицины мы создаем интегрированные программы, используя собственные ресурсы и привлекая лучшую экспертизу отрасли.



Преимущества



Качественная аудитория – в нашей базе действительно врачи – более 100 тыс. контактов из всех регионов РФ. Источники контактов – регистрация на врачебных конференциях, регистрация на сайте с загрузкой скана диплома, подписки на научные журналы



Таргетированная рассылка – выбор врачей для приглашения по специальности, узкой специализации и региону



Собственная оборудованная видеостудия в Москве



Качество подключений к трансляции на неограниченное число участников



Обратная связь с аудиторией – текстовые комментарии (чат) во время трансляции для вопросов спикеру. Ответы в прямом эфире



Учет подключений к просмотру и итоговая статистика



Запись видео публикуется на <https://umedp.ru/> – портале с высокой посещаемостью (открытая статистика Яндекс.Метрики – 12 000 посетителей в день)



МЕДИЦИНСКИЙ
ПОРТАЛ ДЛЯ ВРАЧЕЙ
UMEDP.RU



Диалог
с экспертом



1000+
онлайн-участников



Изображения в 2 окна
(презентация, спикер)



700+
просмотров записи
вебинара на YouTube

Еще больше возможностей предложим по вашему запросу



Реклама

Технический организатор ООО «Медфорум»,
телефон (495) 234-07-34

www.medforum-agency.ru
info@medforum-agency.ru





Никсар®

Биластин

Неседативный антигистаминный препарат, предназначенный для облегчения симптомов сезонного и круглогодичного аллергического риноконъюнктивита и крапивницы¹



Реклама

RU-NIX-01-2020-V-01-print. Одобрено: апрель 2020

Никсар улучшает качество жизни²⁻⁴

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата Никсар®. МНН: Биластин. Лекарственная форма: таблетки, 20мг. **Показания к применению:** Симптоматическое лечение аллергического (сезонного и круглогодичного) риноконъюнктивита: для облегчения чихания, ринореи, зуда и заложенности носа, ощущения зуда и жжения в глазах, покраснения глаз, слезотечения. Симптоматическое лечение крапивницы: для уменьшения кожного зуда и сыпи. **Противопоказания:** повышенная чувствительность к биластину или вспомогательным компонентам препарата; возраст до 12 лет (эффективность и безопасность не установлены); беременность и период грудного вскармливания. Применение препарата Никсар® во время беременности противопоказано в связи с отсутствием клинических данных о безопасности применения у беременных. В связи с отсутствием данных о проникновении биластина в грудное молоко, при необходимости применения препарата Никсар® в период грудного вскармливания, на время приема грудное вскармливание рекомендуется прекратить. **Способ применения и дозы:** Внутрь. Если врачом не предписано иначе, для лечения симптомов аллергического риноконъюнктивита и крапивницы рекомендуются следующие дозы препарата Никсар®: Взрослые и дети старше 12 лет: по 1 таблетке препарата Никсар®, что соответствует 20 мг биластина, один раз в сутки. Максимальная суточная доза биластина составляет 20 мг. Таблетку принимают за один час до еды или через 2 часа после еды (или фруктового сока), запивая достаточным количеством воды. Риска на таблетке предназначена только для деления таблетки с целью облегчения проглатывания, но не для деления таблетки на две равные дозы. Рекомендуется принимать суточную дозу целиком за один прием. При аллергическом риноконъюнктивите препарат Никсар® применяется в течение всего периода контакта с аллергенами. При сезонном аллергическом риноконъюнктивите лечение может быть прекращено после исчезновения симптомов. При повторном появлении симптомов лечение можно возобновить. При круглогодичном аллергическом риноконъюнктивите лечение может продолжаться в течение периода контакта с аллергенами. При крапивнице лечение препаратом Никсар® продолжают до исчезновения или облегчения симптомов. **Побочные эффекты:** в клинических исследованиях у пациентов с аллергическим ринитом или хронической идиопатической крапивницей, получавших биластин в дозе 20 мг общая частота возникновения нежелательных явлений была сопоставима с таковой у плацебо.

У пациентов с умеренным или тяжелым нарушением функции почек следует избегать одновременного применения биластина и ингибиторов Р-гликопротеина.

Условия отпуска из аптек: по рецепту. Подробная информация содержится в инструкции по медицинскому применению препарата Никсар®. Информация для специалистов здравоохранения

¹ Инструкция по медицинскому применению препарата Никсар® от 30.10.2019

² Jauregui I et al. J Invest Allergol Clin Immunol 2011; 21:16-23

³ Bachert C et al. Allergy, 2009;64:158-65.

⁴ Zuberbier T et al. Allergy 2010;65:516-28

ООО «Берлин-Хеми/А. Менарини», 123112, Москва, Пресненская набережная, 10, БЦ «Башня на Набережной», блок Б. Тел.: (495) 785-01-00, факс: (495) 785-01-01, www.berlin-chemie.ru.



**БЕРЛИН-ХЕМИ
МЕНАРИНИ**